

ループス腎炎*

*:既存治療で効果不十分なループス腎炎

適正使用ガイド

監修：産業医科大学 医学部第1内科学講座 田中良哉

生物由来製品、処方箋医薬品^{注)}

抗CD20モノクローナル抗体
リツキシマブ(遺伝子組換え)製剤

薬価基準収載

リツキサブ[®]点滴静注 100mg
リツキサブ[®]点滴静注 500mg
Rituxan[®] Intravenous Infusion

注)^{注)}注意—医師等の処方箋により使用すること

1. 警告

- 1.1 本剤の投与は、緊急時に十分に対応できる医療施設において、適応疾患の治療又は臓器移植に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤の使用が適切と判断される症例のみに行うこと。また、治療開始に先立ち、患者又はその家族に有効性及び危険性を十分に説明し、同意を得てから投与を開始すること。
- 1.2 本剤の投与開始後30分～2時間よりあらわれるinfusion reactionのうちアナフィラキシー、肺障害、心障害等の重篤な副作用(低酸素血症、肺浸潤、急性呼吸促迫症候群、心筋梗塞、心室細動、心原性ショック等)により、死亡に至った例が報告されている。これらの死亡例の多くは初回投与後24時間以内にみられている。また、本剤を再投与した時の初回投与後にも、これらの副作用があらわれるおそれがある。本剤投与中はバイタルサイン(血圧、脈拍、呼吸数等)のモニタリングや自他覚症状の観察を行うとともに、投与後も患者の状態を十分観察すること。特に以下の患者については発現頻度が高く、かつ重篤化しやすいので注意すること。
[7.1、7.2、7.8、8.1、9.1.2、11.1.1 参照]
・血液中に大量の腫瘍細胞がある(25,000/ μ L以上)など腫瘍量の多い患者
・脾腫を伴う患者
・心機能、肺機能障害を有する患者
- 1.3 腫瘍量の急激な減少に伴い、腎不全、高カリウム血症、低カルシウム血症、高尿酸血症、高リン血症等の腫瘍崩壊症候群(tumor lysis syndrome)があらわれ、本症候群に起因した急性腎障害による死亡例及び透析が必要となつた患者が報告されている。血液中に大量の腫瘍細胞がある患者において、初回投与後12～24時間以内に高頻度に認められることから、急激に腫瘍量が減少した患者では、血清中電解質濃度及び腎機能検査を行うなど、患者の状態を十分観察すること。また、本剤を再投与した時の初回投与後にも、これらの副作用があらわれるおそれがある。
[8.2、11.1.2 参照]
- 1.4 B型肝炎ウイルスキャリアの患者で、本剤の治療期間中又は治療終了後に、劇症肝炎又は肝炎の増悪、肝不全による死亡例が報告されている。
[8.3、9.1.3、11.1.3 参照]
- 1.5 皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis: TEN)等の皮膚粘膜症状があらわれ、死亡に至った例が報告されている。
[11.1.5 参照]
- 1.6 間質性肺炎を合併する全身性強皮症患者で、本剤の投与後に間質性肺炎の増悪により死亡に至った例が報告されている。
[2.2、9.1.9、11.1.9 参照]

2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)

〈効能共通〉

- 2.1 本剤の成分又はマウスタンパク質由来製品に対する重篤な過敏症又はアナフィラキシーの既往歴のある患者
〈全身性強皮症〉
- 2.2 重度の間質性肺炎を有する患者[症状が悪化するおそれがある]
[1.6 参照]



全薬販売株式会社

CONTENTS

はじめに	2
リツキサン投与に関するフローチャート	3
効能又は効果	4
効能又は効果に関連する注意	4
用法及び用量	5
用法及び用量に関連する注意	5
リツキサンの投与にあたって	6
患者の選択について	6
特に注意を要する患者	7
患者ならびにご家族に対する説明	10
注射液調製時の注意	12
前投与(Premedication)について	13
リツキサンの投与について	14
①初回投与時～初回投与終了後の注意	14
②2回目以降の投与時の注意	15
③再投与(再治療)について	16
相互作用(併用注意)	17
特に注意を要する副作用とその対策	18
①Infusion reaction	19
②感染症	21
③B型肝炎ウイルスの再活性化による劇症肝炎、肝炎の増悪	22
④皮膚粘膜症状	24
⑤汎血球減少、白血球減少、好中球減少、無顆粒球症、血小板減少	25
⑥間質性肺炎	26
⑦進行性多巣性白質脳症(PML)	27
⑧その他	28
観察期間について	29
副作用及び臨床検査値異常の発現状況	30
Infusion reactionの発現傾向について	32
血液毒性について	33
国内使用実態調査	34
Q&A	42
参考文献	49
リツキサン Drug Information	50

はじめに

このガイドは、「既存治療で効果不十分なループス腎炎」の治療において、リツキサン点滴静注100mg及び500mgの調製、投与に関する注意や、モニタリング項目、副作用とその対策について解説したものです。

リツキサンのご使用にあたっては、電子化された添付文書ならびに本適正使用ガイドを熟読の上、適正使用をお願いいたします。

【リツキサン点滴静注100mg及び500mgについて】

リツキサン点滴静注100mg及び500mgは、米国のIDEC Pharmaceuticals Corporation (IDEC社：現 Biogen Inc.)で創薬されたマウス-ヒトキメラ型モノクローナル抗体であるリツキシマブ(遺伝子組換え)を含有する点滴静注用製剤で、ヒトBリンパ球表面に発現する分化抗原CD^{*1}20に結合し、補体依存性細胞傷害作用(CDC)、抗体依存性細胞介在性細胞傷害作用(ADCC)などにより効果を発揮すると考えられています。

国内外の臨床試験において、本剤は下記疾患に対する有効性・安全性について審査され承認されました。

- CD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫
- CD20陽性の慢性リンパ性白血病
- 難治性のネフローゼ症候群(頻回再発型あるいはステロイド依存性を示す場合)
- 全身性強皮症
- 難治性の尋常性天疱瘡及び落葉状天疱瘡
- 視神経脊髄炎スペクトラム障害(視神経脊髄炎を含む)の再発予防
- ABO血液型不適合移植における抗体関連型拒絶反応の抑制(腎移植・肝移植)

また公知申請により、本剤の下記疾患に対する有効性・安全性の妥当性が評価されました*²。

- 免疫抑制状態下のCD20陽性のB細胞性リンパ増殖性疾患
- 多発血管炎性肉芽腫症、顕微鏡的多発血管炎
- 既存治療で効果不十分なループス腎炎
- 慢性特発性血小板減少性紫斑病
- 後天性血栓性血小板減少性紫斑病


*¹ : cluster of differentiation

*² : 公知申請にて妥当性が評価された適応症については、企業治験が実施されていないため、有効性、安全性に関する情報が限定されます。

リツキサン投与に関するフローチャート

既存治療で効果不十分なループス腎炎に対する投与の場合

リツキサンの投与に際して、治療の必要性を十分検討の上、本剤投与の可否を判断してください。



5. 効能又は効果に関する注意(抜粋)

〈既存治療で効果不十分なループス腎炎〉

5.4 既存治療(ステロイド、免疫抑制剤等)で十分な効果が得られない患者に対して本剤の投与を考慮すること。また、診療ガイドライン等の最新の情報を参考に、本剤の投与が適切と判断される患者に使用すること。

効能又は効果(既存治療で効果不十分なループス腎炎関連のみを抜粋)

2023年8月改訂(第9版)電子化された添付文書に基づく

○既存治療で効果不十分なループス腎炎

5. 効能又は効果に関する注意(抜粋)

〈既存治療で効果不十分なループス腎炎〉

5.4 既存治療(ステロイド、免疫抑制剤等)で十分な効果が得られない患者に対して本剤の投与を考慮すること。また、診療ガイドライン等の最新の情報を参考に、本剤の投与が適切と判断される患者に使用すること。

用法及び用量(既存治療で効果不十分なループス腎炎関連のみを抜粋)

2023年8月改訂(第9版)電子化された添付文書に基づく

〈既存治療で効果不十分なループス腎炎〉

通常、リツキシマブ(遺伝子組換え)として1回量375mg/m²を1週間間隔で4回点滴静注する。

〈効能共通〉

本剤は用時生理食塩液又は5%ブドウ糖注射液にて1~4mg/mLに希釈調製し使用する。

7. 用法及び用量に関する注意(抜粋)

〈効能共通〉

7.1 本剤投与時に頻発してあらわれるinfusion reactionを軽減させるために、本剤投与の30分前に抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤等の前投与を行うこと。また、副腎皮質ホルモン剤と併用しない場合は、本剤の投与に際して、副腎皮質ホルモン剤の前投与を考慮すること。[1.2、7.8、11.1.1 参照]

7.2 注入速度に関する注意: 血圧下降、気管支痙攣、血管浮腫等の症状が発現するので本剤の注入速度を守り、注入速度を上げる際は特に注意すること。症状が発現した場合は注入速度を緩めるかしくは中止する。重篤な症状の場合は直ちに投与を中止し、適切な処置を行う。また、投与を再開する場合は症状が完全に消失した後、中止時点の半分以下の注入速度で投与を開始する。[1.2、11.1.1 参照]

7.3 省略

〈免疫抑制状態下のB細胞性リンパ増殖性疾患、多発血管炎性肉芽腫症、顕微鏡的多発血管炎、既存治療で効果不十分なループス腎炎、難治性のネフローゼ症候群、慢性特発性血小板減少性紫斑病、後天性血栓性血小板減少性紫斑病、全身性強皮症、難治性の尋常性天疱瘡及び落葉状天疱瘡〉

7.4 再投与時の有効性及び安全性に関する情報は限られているため、本剤の再投与に関しては、実施の可否を慎重に検討すること。

〈既存治療で効果不十分なループス腎炎〉

7.9 原則として副腎皮質ステロイド剤を併用すること。

リツキサンの投与にあたって

投与
リツキサンの

本剤の投与に際しては、緊急時に十分対応できる施設及びループス腎炎の治療に対して十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される症例のみに投与してください。

患者の選択について

2023年8月改訂(第9版)電子化された添付文書に基づく

2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)(抜粋)

〈効能共通〉

2.1 本剤の成分又はマウスタンパク質由来製品に対する重篤な過敏症又はアナフィラキシーの既往歴のある患者

5. 効能又は効果に関する注意(抜粋)

〈既存治療で効果不十分なループス腎炎〉

5.4 既存治療(ステロイド、免疫抑制剤等)で十分な効果が得られない患者に対して本剤の投与を考慮すること。また、診療ガイドライン等の最新の情報を参考に、本剤の投与が適切と判断される患者に使用すること。

【参考】

ループス腎炎に対して本剤を投与する場合には、「厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業 自己免疫疾患に関する調査研究(自己免疫班)、日本リウマチ学会、全身性エリテマトーデス診療ガイドライン2019¹⁾」、海外においては「米国リウマチ学会ガイドライン(American College of Rheumatology guidelines for screening, treatment, and management of lupus nephritis)²⁾」「EULAR/ERA-EDTA推奨事項(2019 Update of the Joint European League Against Rheumatism and European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association(EULAR/ERA-EDTA) recommendations for the management of lupus nephritis)³⁾」「全身性エリテマトーデス管理に関するEULAR勧告(2019 Update of the EULAR recommendations for the management of systemic lupus erythematosus)⁴⁾」「小児発症性ループス腎炎の診断と治療に関する欧州推奨事項(European evidence-based recommendations for the diagnosis and treatment of childhood-onset lupus nephritis: the SHARE initiative)⁵⁾」の他、「厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事業) ANCA関連血管炎診療ガイドライン2023⁶⁾」「日本小児腎臓病学会編 小児特発性ネフローゼ症候群診療ガイドライン2020⁷⁾」等をご参照ください。なおガイドラインは隨時更新されていますので、最新のガイドラインをご確認ください。

特に注意を要する患者

◆感染症を合併している患者

本剤の投与後より末梢血リンパ球、特にBリンパ球の減少があらわれ、治療後も持続します。

このように、本剤を投与することにより免疫が抑制された状態になり、感染症を合併している患者では病態を悪化させるおそれがあります。

- 本剤投与後は患者の状態を十分に観察してください。
- 感染症が生じた場合は適切な治療を行ってください。
- 患者の状態に応じて、ST合剤等の投与を行ってください。

関連情報：末梢血リンパ球・免疫グロブリンの減少について

B細胞性非ホジキンリンパ腫を対象とした国内臨床第II相試験^⑧において、本剤の投与中より末梢血リンパ球の減少があらわれ、治療終了9ヵ月後も持続する症例が報告されています。

また、血清免疫グロブリンが減少し、治療終了6ヵ月後の時点でも正常値まで回復しない症例が報告されています。さらに、国内の市販後の使用においても、本剤投与後にガンマグロブリン値が低下した症例が報告されています。

- 感染症に関する副作用情報については、「特に注意を要する副作用とその対策-②感染症」(P21)もご熟読ください。

◆重篤な骨髓機能低下のある患者

重篤な骨髓機能低下のある患者に投与した場合、好中球減少、血小板減少があらわれ重篤化するおそれがあります。

- 治療期間中及び治療終了後は定期的に血液検査を行うなど患者の状態を十分に観察し、異常が認められた場合は、適切な処置を行ってください。

◆B型肝炎ウイルス感染のある患者又はその疑いのある患者

B細胞性非ホジキンリンパ腫を対象とした海外での市販後の使用において、HBs抗体陽性患者に本剤を投与した7ヵ月後に、HBs抗体が陰性となりB型肝炎を発症した症例が報告されています^⑨。

また、B細胞性非ホジキンリンパ腫を対象とした国内の市販後の使用において、B型肝炎ウイルスキャリアの患者に本剤を投与し、劇症肝炎又は肝炎の増悪により死亡した症例、及び既往感染者(HBs抗原陰性、かつHBc抗体又はHBs抗体陽性)に本剤を投与して、B型肝炎ウイルスの再活性化による劇症肝炎で死亡した症例が報告されています。

- 本剤投与に先立ってB型肝炎ウイルス感染の有無を確認し、本剤投与前に適切な処置を行ってください。また、治療期間中及び治療終了後は継続して肝機能検査や肝炎ウイルスマーカー(HBs抗原、HBs抗体、HBc抗体等)、HBV-DNA量のモニタリングを行うなど患者の状態を十分に観察し、異常が認められた場合は、抗ウイルス薬の投与等の適切な処置を行ってください(B型肝炎ウイルスの再活性化による劇症肝炎、肝炎の増悪については「特に注意を要する副作用とその対策」(P22)参照)。

- 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性の肝・胆道疾患に対する調査研究」班及び同肝炎等克服緊急対策研究事業「肝硬変を含めたウイルス性肝疾患の治療の標準化に関する研究」班より「免疫抑制・化学療法により発症するB型肝炎対策ガイドライン」(2019年3月改訂)が、また日本肝臓学会より「B型肝炎治療ガイドライン(第4版)」(2022年6月)が示されています。

- B型肝炎ウイルス再活性化に関する副作用情報については、「特に注意を要する副作用とその対策-③B型肝炎ウイルスの再活性化による劇症肝炎、肝炎の増悪」(P22)もご熟読ください。

◆心機能障害のある患者又はその既往歴のある患者

他疾患に対する海外での市販後の使用において、不整脈や狭心症等の心機能障害を合併する患者又はその既往歴のある患者に本剤を投与し、これらの症状が悪化又は再発した症例が報告されています¹⁰⁾。

- 本剤投与中又は投与終了後に心電図や心エコー等によるモニタリングを行うなど、患者の状態を十分に観察してください。
- 心障害に関する副作用情報については、「特に注意を要する副作用とその対策-⑧その他」(P28)もご熟読ください。

◆肺機能障害のある患者又はその既往歴のある患者

他疾患に対する海外での臨床試験や市販後の使用において、肺機能障害のある患者又はその既往歴のある患者に本剤を投与し、重篤な肺うつ血及び間質性肺炎を生じ、呼吸困難におちいった症例や肺機能障害が悪化した症例が報告されています。

また、B細胞性非ホジキンリンパ腫を対象とした国内の市販後の使用成績調査では、肺機能障害を合併している患者又はその既往歴のある患者では300例中182例(60.7%)、これらのない患者では2,275例中1,211例(53.2%)に非血液毒性が発現しました¹¹⁾。

- 十分注意して経過を観察してください。
- 間質性肺炎に関する副作用情報については、「特に注意を要する副作用とその対策-⑥間質性肺炎」(P26)もご熟読ください。

◆降圧剤による治療中の患者

本剤投与中に一過性の血圧下降があらわれることがあります。

- 本剤投与中より血圧の変動に注意し、患者の状態を十分に観察してください。また、投与後の起立性低血圧による転倒等にも注意してください。
- 血圧下降に関する副作用情報については、「特に注意を要する副作用とその対策-⑧その他」(P28)もご熟読ください。

本剤投与中はバイタルサインのモニタリングや自他覚症状の観察を行うとともに、投与後も患者の状態を十分に観察してください。

検査項目

- ・本剤投与前には臨床検査を実施し、全身状態と主要臓器の状態を観察の上、本剤投与の実施の是非について検討してください。
- ・本剤投与において、重大な副作用が報告されています。電子化された添付文書、本適正使用ガイド等を熟読し、投与中はバイタルサイン（血圧、脈拍、呼吸数等）のモニタリングや、自他覚症状を慎重に観察するとともに必要に応じて追加の検査をご検討ください。
- ・本剤投与後の観察期間に、検査値の変動に留意し患者の状態を観察してください。

→肝炎ウイルス検査は必ず実施してください。投与前ならびに治療期間中の肝炎ウイルス検査につきましては、日本肝臓学会より発出されている「B型肝炎治療ガイドライン(第4版)」(2022年6月)に準じてご対応ください。

【治療前】

一般状態の観察	[血圧・体温・脈拍・体重]
血液一般検査	[白血球数・白血球分画・赤血球数・血色素量・血小板数]
血液生化学的検査	[総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・血清免疫グロブリン(IgG、IgA、IgM)・AI-P・AST・ALT・LDH・BUN・クレアチニン・尿酸・電解質(Na、K、Cl、Ca、P)・CRP]
尿検査	[蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血]
心機能検査	[心電図] ^{*1}
呼吸機能検査	[SpO ₂ ・PaO ₂] ^{*1}
肝炎ウイルス検査	[HBV(HBs抗原、HBc抗体、HBs抗体)・HCVのマーカー [#] 、ウイルス量] ^{*2}

【治療期間中～治療終了後】

一般状態の観察	[血圧・体温・脈拍・体重]
血液一般検査	[白血球数・白血球分画・赤血球数・血色素量・血小板数]
血液生化学的検査	[血清免疫グロブリン(IgG、IgA、IgM)・電解質(Na、K、Cl)]
尿検査	[蛋白・糖・潜血]
心機能検査	[心電図] ^{*1}
肝炎ウイルス検査	[HBV(HBs抗原、HBc抗体、HBs抗体)・HCVのマーカー [#] 、ウイルス量] ^{*2}

*1：心機能、呼吸機能障害が疑われる場合に検査を行ってください。

*2：検査実施済みの場合は結果を再確認してください。

#：HBV、HCVの各種抗原、抗体検査

患者ならびにご家族に対する説明

リツキサンの治療対象に選択された患者又はその家族に対しては、投与前に本剤の効果、副作用、副作用対策等の治療上のリスクとベネフィットを十分に説明し、同意を得てください。

感染症について

本剤のリンパ球傷害作用によりBリンパ球が枯渇し、免疫抑制状態となるおそれがあり、このような場合に感染症を生じる可能性があります。

本剤投与中及び投与終了後は患者の状態を十分に観察してください。

本剤投与後に重篤なニューモシスチス肺炎を発現した症例が報告されていることから、リスクの高い患者ではST合剤を投与するなど、必要に応じて、適切な予防措置を検討してください（「感染症」（P21）参照）。

伝達性海綿状脳症(TSE)について

本剤の投与によりTSEがヒトに伝播したとの報告はありません。本剤は、マスターセルバンク構築時にカナダ、米国又はニュージーランド産ウシの血清由来成分（ウシ胎児血清及びフェツイン）を使用していますが、理論的なリスク評価を行って一定の安全性を確保する目安に達していることを確認しています。しかしながら、TSEの潜在的伝播の危険性を完全に排除することはできないことから、疾病の治療上の必要性を十分に検討の上、本剤を投与してください。投与に先立ち、患者への有用性と安全性の説明も考慮してください。

副作用について

本剤の投与にあたり、次のような症状が高頻度に発現しやすいことを患者に説明してください。

これらの症状は投与開始後や注入速度上昇後に突然あらわれることもあります。

・発熱	・寒気	・吐き気	・頭痛
・疼痛	・かゆみ	・発疹	・虚脱感
・倦怠感	・感染症	・咽喉頭炎	・鼻炎
・口腔咽頭不快感	・頻脈	・嘔吐	・腹痛
・口内炎	・ほてり	・多汗	・貧血

→副作用情報については、「特に注意を要する副作用とその対策」（P18～28）もご熟読ください。

ワクチン接種について

◆生ワクチン又は弱毒生ワクチンの接種について

本剤投与後の生ワクチン接種に関する安全性のデータはありませんが、本剤投与後に生ワクチンを接種した場合、接種したワクチンに起因する感染症が発症するおそれがあります。

接種したワクチンに起因する感染症の症状が発現した場合には適切な処置を行ってください。

◆不活化ワクチンの接種について

本剤投与予定の患者は、初回投与の少なくとも4週間前までにワクチンの接種を完了させることが望ましいと考えられます。本剤投与後に不活化ワクチンを接種した場合、ワクチンの効果を減弱するおそれがあります。

米国での臨床試験(IDE-C-102-12 : ClinicalTrials.gov Identifier NCT00090038)において、無治療健康群と比較し、本剤単剤治療を受けた低悪性度非ホジキンリンパ腫患者群で不活化ワクチン接種効果の減弱が認められました。

また、リツキサン等の抗CD20抗体薬を含む治療を受けているB細胞性非ホジキンリンパ腫患者において、インフルエンザワクチン接種への反応が著しく劣るとの報告¹²⁾があります。

妊娠、産婦、授乳婦への投与について

妊娠又は妊娠している可能性のある女性には治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与を検討してください。

なお、ヒトIgGは胎盤関門を通過することが知られており、妊娠中に本剤を投与した患者の出生児において、末梢血リンパ球の減少が報告されています。

本剤のがん原性、変異原性に関するデータ、胎児に及ぼす影響に関するデータ、あるいは男女の生殖能に及ぼす影響に関するデータはありません。したがって、本剤投与中及び投与後12カ月の間は避妊していただくよう、患者に説明してください。

授乳婦への投与については、治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討してください。本剤は母乳中に移行することが報告されています¹³⁾。

【参考】Rituxan米国添付文書(2021年12月改訂)より

患者指導のための情報

投与終了後6カ月間は血清中に本剤が検出される。

生殖可能な患者では、本剤治療中及び投与後12カ月まで有効な避妊法を使用すること。

小児への投与

既存治療で効果不十分なループス腎炎に対する低出生体重児、新生児、乳児を対象とした臨床試験は実施していません。

【参考】患者ならびにご家族への説明用資材のご案内

患者ならびにご家族への説明用としまして下記資材もご活用ください。

- ループス腎炎BOOK
- 患者向医薬品ガイド

注射液調製時の注意

投与
リツキサンの

リツキサンの調製方法

1. 希釀液として生理食塩液又は5%ブドウ糖注射液以外は使用しないでください。

体表面積からリツキサンの必要量(リツキシマブ(遺伝子組換え)として1回量375mg/m²)を無菌下に取り出し、希釀に必要な量の生理食塩液又は5%ブドウ糖注射液の入った点滴静注用バッグに注入します。

リツキシマブ最終濃度1~4mg/mL

2. 点滴静注用バッグを穏やかに反転して溶液を混和します。抗体が凝集するおそれがあるので、希釀時及び希釀後に泡立つような激しい振動を加えないようにしてください。
3. 希釀後の液は速やかに使用するようにしてください。また、本剤には防腐剤が含まれていないため、バイアルに残った未使用のリツキサンは細菌汚染のおそれがあるので使用しないでください。
→他剤との混注はしないでください。他の薬剤と混合した場合、製剤の安定性及び安全性に問題が生じる可能性があります。
4. 点滴静注用バッグ中の溶液について、外観上の異常がないことを投与前に目視にて点検してください。

【参考】調製方法



前投与(Premedication)について

前投与の必要性

本剤の投与に関連して、初回投与から投与開始24時間以内にinfusion reactionが頻発します。

ループス腎炎を対象とした国内使用実態調査^{14, 15)}において、115例中6例(5.2%)、11件でinfusion reactionの発現が報告されました。主な症状は、発熱、関節痛、悪寒、浮腫、発疹でした。

なお、B細胞性非ホジキンリンパ腫を対象とした国内臨床第Ⅱ相試験¹⁶⁾では、合計873件の非血液毒性が発現しましたが、そのうちの約90%にあたる790件がinfusion reactionでした。

本剤投与時に頻発するinfusion reaction(発熱、悪寒、頭痛等)を軽減させるために、本剤の各回点滴静注開始30分前に抗ヒスタミン剤及び解熱鎮痛剤等の前投与を行ってください。また、副腎皮質ホルモン剤と併用しない場合は、本剤の投与に際して、副腎皮質ホルモン剤の前投与を考慮してください。

→抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤、副腎皮質ホルモン剤等の前投与を行った患者においても、重篤なinfusion reactionが発現したとの報告があります。患者の状態を十分に観察してください。

→Infusion reactionについては、以下のページもご参照ください。

- ・「特に注意を要する副作用とその対策-①」(P19)
- ・「Infusion reactionの発現傾向について」(P32)

【参考】

B細胞性非ホジキンリンパ腫を対象とした国内臨床第I相¹⁷⁾、第Ⅱ相試験^{8, 18)}では次の薬剤が使用されました。

	第I相試験	第Ⅱ相試験
抗ヒスタミン剤	ジフェンヒドラミン塩酸塩 30mg	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 2mg
解熱鎮痛剤	アセトアミノフェン 500mg	イブプロフェン 200mg

7. 用法及び用量に関する注意(抜粋)

〈効能共通〉

7.1 本剤投与時に頻発してあらわれるinfusion reactionを軽減させるために、本剤投与の30分前に抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤等の前投与を行うこと。また、副腎皮質ホルモン剤と併用しない場合は、本剤の投与に際して、副腎皮質ホルモン剤の前投与を考慮すること。[1.2, 7.8, 11.1.1 参照]

〈既存治療で効果不十分なループス腎炎〉

7.9 原則として副腎皮質ステロイド剤を併用すること。

リツキサンの投与について

1 初回投与時～初回投与終了後の注意

- ・本剤の投与に関連して発現する重篤な副作用等は初回投与時に高頻度に認められることから、初回の投与はできるかぎり入院で実施してください。
- ・**患者の状態に応じて、注入開始速度を適宜減速することができます。**

投与経路：必ず**点滴静脈内投与**としてください。


急速静注、静脈内大量投与及び皮下投与、筋肉内投与等、静脈以外の経路による投与はしないでください。

投与直前：点滴静注用バッグ中の溶液について、外観上の異常がないことを目視にて点検してください。

注入速度：最初の30分は50mg/時で開始し、患者の状態を十分観察しながら、その後30分毎に50mg/時ずつ上げて、最大400mg/時まで上げることができます。

注入速度を守るために必ず輸液ポンプを使用してください。

初回投与の注入速度



■本剤の注入速度を守り、投与中から投与終了後1時間はバイタルサインのモニタリング、自他覚症状の観察を十分に行ってください。

■本剤の注入速度に関連して血圧下降、気管支痙攣、血管浮腫等の症状が発現するので注入速度を守ってください。これらの症状は**注入速度を上げた直後に発現しやすい**ので、注入速度を上げた後は特に注意深く観察してください。

■**軽微から中等度**の症状が認められた場合、症状により**注入速度を緩めるか、投与の中止も考慮**してください。また、**重篤な**症状が認められた場合には、直ちに**投与を中止し、適切な処置**を行ってください。

■投与を再開する場合は、**症状が完全に消失した後、中止時点の半分以下の注入速度**で投与を開始してください。

→患者の状態によっては、**注入速度をさらに減じることも考慮**してください。


2 2回目以降の投与時の注意

- 2回目以降の投与前にも臨床検査等を実施し、患者の状態を確認してから投与を決定してください。


前投与：2回目以降の本剤投与時においても、**各回点滴静注開始30分前に前投与(Premedication)**を行ってください。

注入速度：初回投与時に発現した副作用が軽微であった場合、100mg/時まで上げて投与を開始し、その後30分毎に100mg/時ずつ上げて、最大400mg/時まで上げることができます。

前回投与時に発現した副作用が軽微でなかった場合の注入速度



前回投与時に発現した副作用が軽微であった場合の注入速度



→初回投与時と同様に本剤の注入速度を守り、バイタルサインのモニタリングや患者の観察を十分に行ってください。

→初回投与時に副作用が認められない症例においても、2回目以降に初めて副作用が発現することがありますので患者の観察を十分に行ってください。

5. 効能又は効果に関する注意(抜粋)

〈既存治療で効果不十分なループス腎炎〉

5.4 既存治療(ステロイド、免疫抑制剤等)で十分な効果が得られない患者に対して本剤の投与を考慮すること。また、診療ガイドライン等の最新の情報を参考に、本剤の投与が適切と判断される患者に使用すること。

3 再投与(再治療)について

- 既存治療で効果不十分なループス腎炎に対して本剤を再投与した際の有効性及び安全性に関する情報は限定されています。したがって、本剤の再投与にあたっては、患者のリスク・ベネフィットを十分に考慮し、実施の可否を決定してください。
- 再投与時も初回治療時と同様の検査を実施し、患者の状態を確認してから投与を決定してください。
- 再投与時の初回投与は、初回治療時と同様にできるかぎり入院で実施してください。

B細胞性非ホジキンリンパ腫を対象とした国内での市販後の使用成績調査の結果、再投与時の副作用は、程度、頻度ともに初回治療(本剤による初めての治療)時より高くなる傾向は認められませんでした¹⁹⁾。

前投与：本剤の各回点滴静注開始30分前に前投与(Premedication)を行ってください。

注入速度：本剤の再投与時の初回投与においても重篤な副作用が発現するおそれがあることから、最初の30分は50mg/時の速度で開始してください。

2回目以降の注入開始速度は**初回投与時に発現した副作用が軽微であった場合**、100mg/時まで上げて開始できます。

- 初回治療時と同様に本剤の注入速度を守り、バイタルサインのモニタリングや患者の観察を十分に行ってください。
- 本剤が投与された患者では**異種抗体(ヒト抗キメラ抗体)を生じることがあります**。このような患者に再投与された場合は、アレルギー、過敏反応等が発現するおそれがあります。
- 再投与の可否を判断するための基準は確立されていません。

【参考】CD20陽性の低悪性度又はろ胞性非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫を対象とした使用成績調査¹⁹⁾における初回投与時と再投与時の副作用発現頻度(対象例数 187例^{*1})

副作用種類	発現例数(頻度)	
	初回投与時	再投与時
副作用全体	124(66.3%)	80(42.8%)
血液毒性(単剤使用73例)	7 (9.6%)	10(13.7%)
臨床検査値異常	18 (9.6%)	10 (5.3%)
非血液毒性	115(61.5%)	64(34.2%)
infusion reaction	109(58.3%)	45(24.1%)
重篤な副作用	16 (8.6%)	18 (9.6%)

調査概要：本剤の国内市販開始時(2001年9月)より実施した全例調査に登録された症例の内、2003年3月31日までに本剤の再投与が開始された症例を対象とし、後方視的に調査した特別調査で認められた副作用(リツキシマブとの因果関係が否定されなかった有害事象)を集計した。

*1：後方視的調査(安全性評価対象200例)における初回投与時との安全性を比較することが可能であった187例

相互作用(併用注意)

2023年8月改訂(第9版)電子化された添付文書に基づく

併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
生ワクチン又は弱毒生ワクチン	接種した生ワクチンの原病に基づく症状が発現した場合には適切な処置を行う。	Bリンパ球傷害作用により発病するおそれがある。
不活化ワクチン	ワクチンの効果を減弱させるおそれがある。	Bリンパ球傷害作用によりワクチンに対する免疫が得られないおそれがある。
免疫抑制作用を有する薬剤 免疫抑制剤 副腎皮質ホルモン剤等	発熱などの感染症(細菌及びウイルス等)に基づく症状が発現した場合は、適切な処置を行う。	過度の免疫抑制作用による感染症誘発の危険性がある。
降圧剤 [11.1.13 参照]	一過性の血圧下降があらわれることがある。	血圧下降を増強させるおそれがある。

※ワクチン接種につきましては、「患者ならびにご家族に対する説明」(P10)もあわせてご参照ください。

特に注意を要する副作用とその対策

※最新の副作用情報につきましては、担当MRまでお問い合わせください。

国内外でのリツキサン投与におきまして、下記の重大な副作用が報告されています。
本剤の投与にあたっては、これら副作用に対して特にご注意ください。

- ① Infusion reaction** P19
- ② 感染症** P21
- ③ B型肝炎ウイルスの再活性化による劇症肝炎、肝炎の増悪** P22
- ④ 皮膚粘膜症状** P24
- ⑤ 汎血球減少、白血球減少、好中球減少、無顆粒球症、血小板減少** P25
- ⑥ 間質性肺炎** P26
- ⑦ 進行性多巣性白質脳症(PML)** P27
- ⑧ その他** P28
 - 消化管穿孔・閉塞
 - 可逆性後白質脳症症候群(RPLS)等の脳神経症状
 - 腎障害
 - 肝機能障害、黄疸
 - 心障害
 - 血圧下降

上記副作用以外にも、重大な副作用が報告されています。投与の際は電子化された添付文書、本適正使用ガイド等を熟読し、投与中はバイタルサイン(血圧、脈拍、呼吸数等)のモニタリングや、自他覚症状の観察を慎重に行ってください。

1 Infusion reaction

本剤の投与に関連して、投与中から投与開始24時間以内に多くあらわれる副作用のことをいいます。一般的な点滴静注に伴う過敏症、ショック等と類似した発熱、悪寒、そう痒等の症状があらわれますが、一般的な過敏症状と区別するため日本語に訳さず英文表記を用いています。

→ Infusion reactionに関する副作用情報は、「Infusion reactionの発現傾向について」(P32)もあわせてご熟読ください。

発現状況

ループス腎炎を対象とした国内使用実態調査^{14, 15)}において、115例中6例(5.2%)に計11件のinfusion reactionが発現しました。そのうち重篤な症状は5件(発熱、関節痛、悪寒、浮腫、発疹)でした(重篤性評価は各医師の判断による)。

【参考】

B細胞性非ホジキンリンパ腫を対象としたリツキシマブ単剤による国内臨床第Ⅱ相試験¹⁶⁾において、合計873件の非血液毒性が発現しましたが、そのうちの約90%にあたる790件がinfusion reactionでした。

なお、Grade 3以上の非血液毒性は5件(疼痛、血圧上昇、悪寒、虚脱感、多汗)でした。

副作用

発現時期

Infusion reactionの大半は初回点滴静注開始後30分～2時間より24時間以内にあらわれます。また、infusion reactionの発現には一定の傾向が認められ、初回投与時、特に注入速度を最初に上げた後30～60分の間に多く発現しています。

→ 詳細につきましては、「Infusion reactionの発現傾向について」(P32)もあわせてご熟読ください。

症 状

●主な症状

発熱、悪寒、悪心、頭痛、疼痛、そう痒、発疹、咳、虚脱感、血管浮腫、口内乾燥、多汗、眩暈、倦怠感等

●重篤な症状

アナフィラキシー、肺障害、心障害等の重篤な副作用(低酸素血症、肺浸潤、急性呼吸促迫症候群、心筋梗塞、心室細動、心原性ショック、低血圧、血管浮腫、気管支痙攣、肺炎、閉塞性細気管支炎等)

発現機序

Infusion reactionの発現機序については、明らかにされていません。

→ 臨床上の症状は過敏症、アナフィラキシーに似ている場合がありますが、初回投与で発現した症例において2回目以降の投与時には症状が認められないケースが報告されています。

(Q&A「Infusion reactionとアナフィラキシーとはどう違うのですか?」(P45)参照)

注意を要する患者

次の患者についてはinfusion reactionの発現頻度が高く、かつ重篤化しやすいので患者の状態を十分に観察して投与してください。

- 心機能障害を有する患者及びその既往歴がある患者
- 肺機能障害を有する患者及びその既往歴がある患者

観察項目

本剤投与中は、血圧、脈拍、呼吸数等のバイタルサインのモニタリングや自他覚症状の観察を行い、また投与後も患者の状態を十分に観察してください。

対処法

●予防法

Infusion reactionの予防として、抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤等の前投与を必ず行ってください。また、本剤の投与に際し、必要に応じて副腎皮質ホルモン剤の前投与を考慮してください。(「前投与(Premedication)について」(P13)参照)

●軽微～中等度の場合

投与中に異常が認められた場合は、患者の状態を十分に観察し、必要に応じた治療を行ってください。場合により本剤の注入速度を緩めるか投与を中止することも考慮してください。

本剤の中止後に投与を再開する場合は、中止時点の半分以下の注入速度で投与を開始してください。本剤の投与終了後に症状が発現した場合も、必要に応じた治療を行うとともに、症状が回復するまで慎重に経過観察を行ってください。

(主な対処法)抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤の投与等

●重篤な場合

投与中に異常が認められた場合は直ちに投与を中止し、必要に応じた治療を行うとともに、症状が回復するまで患者の状態を十分に観察してください。投与を再開する場合は、症状が完全に消失した後、中止時点の半分以下の注入速度で患者の状態を十分に観察しながら投与を開始してください。

(主な対処法)酸素吸入、昇圧剤、気管支拡張剤、副腎皮質ホルモン剤の投与等

なお、重篤なinfusion reactionが認められた患者に対する再投与(再治療)の可否を判断するための基準は確立していないため、本剤投与によるリスク・ベネフィットを評価の上、このような患者に投与する際には、より注意深く患者の状態を観察してください。

7. 用法及び用量に関する注意(抜粋) (効能共通)

7.1 本剤投与時に頻発してあらわれるinfusion reactionを軽減させるために、本剤投与の30分前に抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤等の前投与を行うこと。また、副腎皮質ホルモン剤と併用しない場合は、本剤の投与に際して、副腎皮質ホルモン剤の前投与を考慮すること。[1.2、7.8、11.1.1 参照]

〈既存治療で効果不十分なループス腎炎〉

7.9 原則として副腎皮質ステロイド剤を併用すること。

2 感染症

B細胞性非ホジキンリンパ腫を中心とした国内での市販後の使用において、本剤の投与により細菌、真菌、ウイルスによる重篤な感染症(敗血症、肺炎等)があらわれ、死亡に至った症例が報告されています。

→感染症に関する適正使用情報は、「特に注意を要する患者」(P7)もご熟読ください。

発現状況

ループス腎炎を対象とした国内使用実態調査^{14, 15)}において、115例中12例(10.4%)に計15件の感染症が発現しました。そのうち重篤な症状は3件(硬膜外膿瘍、細菌性腸炎、ニューモシスチス・イロベチイ肺炎)でした(重篤性評価は各医師の判断による)。

【参考】

B細胞性非ホジキンリンパ腫を中心とした国内での市販後の使用において、重篤な感染症^{*1}が987例報告されています。病原体の内訳^{*2}は、ウイルス216例、細菌138例、真菌77例、原虫・藻類5例、不明173例でした。987例中882例が、癌化学療法剤や免疫抑制剤を併用した症例でした(2021年11月17日現在)。

副作用

発現時期(参考データ)

B細胞性非ホジキンリンパ腫を中心とした国内での市販後の使用において、感染症の多くは投与開始から3年の間に発現しているものの、発現時期に一定の傾向は認められていません。

発現機序

本剤の投与によりBリンパ球の枯渇が生じ、また、本剤の副作用である白血球減少、好中球減少が発現した場合、感染防御機構が破綻し、感染症が発現しやすくなると考えられます。

注意を要する患者

次の患者については感染症が発現しやすく重篤化しやすいので、患者の状態を十分に観察して投与してください。(「特に注意を要する患者」(P7)参照)

- 感染症を合併している患者
- 白血球、好中球、リンパ球が減少している患者
- 血清免疫グロブリン値が低下している患者

対処法

感染症の徴候が認められた場合は、本剤の投与を中止し、適切な処置を行ってください。

本剤を投与する際には患者の状態に応じて、感染症に対する適切な予防措置を考慮してください。

本剤の治療中より末梢血リンパ球の減少があらわれ、治療終了後も持続すること、また免疫グロブリンが減少した例が報告されていることなど、免疫抑制作用により細菌やウイルスによる感染症が生じる又は悪化する可能性があります。

*1：肝炎ウイルスの感染を除きます

*2：重複感染例があるため、各原因の和は987例と一致しません。

③ B型肝炎ウイルスの再活性化による劇症肝炎、肝炎の増悪

B細胞性非ホジキンリンパ腫を中心とした国内外での使用において、B型肝炎ウイルス(HBV)キャリアの患者又は既往感染者(HBs抗原陰性、かつHBc抗体又はHBs抗体陽性)に本剤を投与し、劇症肝炎又は肝炎の増悪、肝不全により死亡した症例が報告されています。

→HBVによる劇症肝炎、肝炎の増悪に関する適正使用情報は、「特に注意を要する患者」(P7)もご熟読ください。

発現状況

ループス腎炎を対象とした国内使用実態調査^{14, 15)}においては発現が認められていません。

【市販後の使用における報告(上記以外の疾患への使用時を含む)】

B細胞性非ホジキンリンパ腫を中心とした国内での市販後の使用において、289例に重篤なHBV再活性化、肝炎、肝不全、劇症肝炎が発現しました。このうち、併用の有無不明の25例を除く264例中195例が本剤とステロイドの併用症例でした(2021年11月17日現在)。

また、既往感染者(HBs抗原陰性、かつHBc抗体又はHBs抗体陽性)に本剤を投与して、HBV再活性化による劇症肝炎が発現し、死亡した症例も報告されています。

発現時期(参考データ)

B細胞性非ホジキンリンパ腫を中心とした国内での使用において、本剤の投与による劇症肝炎、重篤な肝炎、肝不全の発現時期に関する解析が可能であった169例のうち約90%の症例が治療終了1年以内に発現し、このうち約80%が半年以内に発現していました。また、一部の症例で1年以上経過後に発現したとの報告があります(2021年5月17日現在)。

予防法

本剤の投与に先立ってHBV感染の有無を確認し適切な措置を行ってください。またHBV-DNA量等の検査値の確認を行うとともに、治療期間中から治療終了後にも継続してHBVマーカー、HBV-DNA量のモニタリングや肝機能検査などを行って十分患者の状態を観察するなど、ガイドライン*に沿った対応を行ってください。

*厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性の肝・胆道疾患に対する調査研究」班及び同肝炎等克服緊急対策研究事業「肝硬変を含めたウイルス性肝疾患の治療の標準化に関する研究」班より「免疫抑制・化学療法により発症するB型肝炎対策ガイドライン」(2019年3月改訂)が、また日本肝臓学会より「B型肝炎治療ガイドライン(第4版)」(2022年6月)が示されています。投与にあたっては本ガイドラインをご熟読ください。

対処法


B型肝炎の発症又は増悪が認められた場合は肝臓専門医に相談するなどの対応もご検討ください。

【参考】

免疫抑制・化学療法により発症するB型肝炎対策ガイドライン

(日本肝臓学会 肝炎診療ガイドライン作成委員会 編「B型肝炎治療ガイドライン(第4版)」2022年6月, P98–100)

https://www.jsh.or.jp/medical/guidelines/jsh_guidlines/hepatitis_b.html(2023年7月参照)



〈補足〉

血液悪性疾患に対する強力な化学療法中あるいは終了後に、HBs抗原陽性あるいはHBs抗原陰性例の一部においてHBV再活性化によりB型肝炎が発症し、その中には劇症化する症例があり、注意が必要である。また、血液悪性疾患または固形癌に対する通常の化学療法およびリウマチ性疾患・膠原病などの自己免疫疾患に対する免疫抑制療法においてもHBV再活性化のリスクを考慮して対応する必要がある。通常の化学療法および免疫抑制療法においては、HBV再活性化、肝炎の発症、劇症化の頻度は明らかでなく、ガイドラインに関するエビデンスは十分ではない。また、核酸アナログ投与による劇症化予防効果を完全に保証するものではない。

注1) 免疫抑制・化学療法前に、HBVキャリアおよび既往感染者をスクリーニングする。HBs抗原、HBC抗体およびHBs抗体を測定し、HBs抗原が陽性のキャリアか、HBs抗原が陰性でHBs抗体、HBC抗体のいずれか、あるいは両者が陽性の既往感染かを判断する。HBs抗原・HBC抗体およびHBs抗体の測定は、高感度の測定法を用いて検査することが望ましい。また、HBs抗体単独陽性(HBs抗原陰性かつHBC抗体陰性)例においても、HBV再活性化は報告されており、ワクチン接種歴が明らかである場合を除き、ガイドラインに従った対応が望ましい。

注2) HBs抗原陽性例は肝臓専門医にコンサルトすること。また、すべての症例において核酸アナログの投与開始ならびに終了にあたって肝臓専門医にコンサルトするのが望ましい。

注3) 初回化学療法開始時にHBC抗体、HBs抗体未測定の再治療例および既に免疫抑制療法が開始されている例では、抗体価が低下している場合があり、HBV DNA量検査などによる精査が望ましい。

注4) 既往感染者の場合は、リアルタイムPCR法によりHBV DNAをスクリーニングする。

注5) a. リツキシマブ・オビヌズマブ(土ステロイド)、フルダラビンを用いる化学療法および造血幹細胞移植:既往感染者からのHBV再活性化の高リスクであり、注意が必要である。治療中および治療終了後少なくとも12か月の間、HBV DNAを月1回モニタリングする。造血幹細胞移植例は、移植後長期間のモニタリングが必要である。

b. 通常の化学療法および免疫作用を有する分子標的治療薬を併用する場合:頻度は少ないながら、HBV再活性化のリスクがある。HBV DNA量のモニタリングは1~3か月ごとを目安とし、治療内容を考慮して間隔および期間を検討する。血液悪性疾患においては慎重な対応が望ましい。

c. 副腎皮質ステロイド薬、免疫抑制薬、免疫抑制作用あるいは免疫修飾作用を有する分子標的治療薬による免疫抑制療法:HBV再活性化のリスクがある。免疫抑制療法では、治療開始後および治療内容の変更後(中止を含む)少なくとも6か月間は、月1回のHBV DNA量のモニタリングが望ましい。なお、6か月以降は3か月ごとのHBV DNA量測定を推奨するが、治療内容に応じて迅速診断に対応可能な高感度HBs抗原測定(感度 0.005 IU/mL)あるいは高感度HBコア関連抗原測定(感度 2.1 log IU/mL)で代用することは可能である。

注6) 免疫抑制・化学療法を開始する前、できるだけ早期に核酸アナログ投与を開始する。ことに、ウイルス量が多いHBs抗原陽性例においては、核酸アナログ予防投与中であっても劇症肝炎による死亡例が報告されており、免疫抑制・化学療法を開始する前にウイルス量を低下させておくことが望ましい。

注7) 免疫抑制・化学療法中あるいは治療終了後に、HBV DNA量が20 IU/mL(1.3 Log IU/mL)以上になった時点で直ちに核酸アナログ投与を開始する(20 IU/mL未満陽性の場合は、別のポイントでの再検査を推奨する)。また、高感度HBs抗原モニタリングにおいて1 IU/mL未満陽性(低値陽性)あるいは高感度HBコア関連抗原陽性の場合は、HBV DNAを追加測定して20 IU/mL以上であることを確認した上で核酸アナログ投与を開始する。免疫抑制・化学療法中の場合、免疫抑制薬や免疫抑制作用のある抗腫瘍薬は直ちに投与を中止するのではなく、対応を肝臓専門医と相談する。

注8) 核酸アナログは薬剤耐性の少ないETV、TDF、TAFの使用を推奨する。

注9) 下記の①か②の条件を満たす場合には核酸アナログ投与の終了が可能であるが、その決定については肝臓専門医と相談した上で行う。

①スクリーニング時にHBs抗原陽性だった症例では、B型慢性肝炎における核酸アナログ投与終了基準を満たしていること。②スクリーニング時にHBC抗体陽性またはHBs抗体陽性だった症例では、(1)免疫抑制・化学療法終了後、少なくとも12か月間は投与を継続すること。(2)この継続期間中にALT(GPT)が正常化していること(ただしHBV以外にALT異常の原因がある場合は除く)。(3)この継続期間中にHBV DNAが持続陰性化していること。(4)HBs抗原およびHBコア関連抗原も持続陰性化することが望ましい。

注10) 核酸アナログ投与終了後少なくとも12か月間は、HBV DNAモニタリングを含めて厳重に経過観察する。経過観察方法は各核酸アナログの使用上の注意に基づく。経過観察中にHBV DNA量が20 IU/mL(1.3 Log IU/mL)以上になった時点で直ちに投与を再開する。

*ガイドラインは隨時更新されますので、最新ガイドラインをご確認ください。

4 皮膚粘膜症状

B細胞性非ホジキンリンパ腫を中心とした国内での市販後の使用において、本剤の投与により皮膚粘膜症状が発現し、死亡に至った症例が報告されています。

発現状況

ループス腎炎を対象とした国内使用実態調査^{14, 15)}においては発現が認められていません。

【参考】

B細胞性非ホジキンリンパ腫を中心とした本剤の投与により、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis:TEN)、天疱瘡様症状、苔癬状皮膚炎、小水疱性皮膚炎等の重篤な皮膚粘膜症状が報告されており、国内でも死亡に至った例が1例報告されています(2021年11月17日現在)。

発現時期(参考データ)

B細胞性非ホジキンリンパ腫を中心とした国内での市販後の使用において、皮膚粘膜症状の発現時期に一定の傾向は認められていません。

対処法

重篤な皮膚粘膜症状が発現した場合には、本剤の投与を中止し、速やかに皮膚科専門医に相談するなど、適切な対応を行ってください。

5 汎血球減少、白血球減少、好中球減少、無顆粒球症、血小板減少

B細胞性非ホジキンリンパ腫を中心とした国内での市販後の使用において、本剤の投与による重篤な血球減少を発現した症例が報告されています（「血液毒性について」（P33）参照）。

発現状況

ループス腎炎を対象とした国内使用実態調査^{14, 15)}において、115例中重篤な汎血球減少症が1例、重篤な無顆粒球症が1例、非重篤な血小板減少が2例に認められました（重篤性評価は各医師の判断による）。

【参考】

低悪性度リンパ腫を対象としたリツキシマブ単剤による国内臨床第II相試験²⁰⁾の投与症例90例中、Grade 3以上の好中球減少が18例（20.0%）、白血球減少が14例（15.6%）、血小板減少が3例（3.3%）に認められ、中・高悪性度非ホジキンリンパ腫を対象としたリツキシマブ単剤による国内臨床第II相試験²¹⁾の投与症例67例中、Grade 3以上の好中球減少が11例（16.4%）、白血球減少が5例（7.5%）に認められました。

また、B細胞性非ホジキンリンパ腫を中心とした国内での市販後の使用成績調査の投与症例3,712例中、重篤な汎血球減少が50例（1.3%）報告されており、このうち47例が癌化学療法剤併用症例、また、残り3例中2例は本剤投与前1ヵ月以内に癌化学療法剤による治療を受けていました。

発現時期（参考データ）

- B細胞性非ホジキンリンパ腫を中心とした国内外の市販後の使用において、血球減少が発現した時に一定の傾向は認められていません。
- B細胞性非ホジキンリンパ腫を中心とした国内外の市販後の使用において、本剤の最終投与から4週間以上経過して好中球が減少した症例が報告されています。また、国内の臨床試験において、本剤の最終投与から8ヵ月後に好中球数が最低値に達した症例が報告されています。
- B細胞性非ホジキンリンパ腫を中心とした国内外の市販後の使用において、本剤投与後の好中球減少が4週間以上持続する症例が報告されています。

注意を要する患者

次の患者につきましては、血液毒性が発現しやすく重篤化しやすいので、患者の状態を十分に観察してください。

- 重篤な骨髄機能低下のある患者（「特に注意を要する患者」（P7）参照）

対処法

治療期間中及び治療終了後は定期的に血液検査を行うなど患者の状態を十分に観察し、重篤な血球減少が認められた場合は、本剤の休薬や必要に応じた治療等の適切な処置を行ってください。特に、重篤な好中球減少が認められた場合においては、本剤を休薬するとともに必要に応じた治療を行ってください。

6 間質性肺炎

B細胞性非ホジキンリンパ腫を中心とした国内での市販後の使用において、本剤の投与により間質性肺炎が発現し、死亡に至った症例が報告されています。

発現状況

ループス腎炎を対象とした国内使用実態調査^{14, 15)}においては発現が認められていません。

【参考】

B細胞性非ホジキンリンパ腫を中心とした国内での市販後の使用において、187例に重篤な間質性肺炎が発現しました。このうち、併用の有無不明の7例を除く180例中162例が化学療法を併用しており、120例が65歳以上でした(2021年11月17日現在)。

発現時期(参考データ)

B細胞性非ホジキンリンパ腫を中心とした国内での市販後の使用において、多くは本剤の投与開始から12週後までに発現しているものの、発現時期に一定の傾向は認められません。また、投与開始後25週以上経過してから発現した症例も報告されています。

対処法

発熱、呼吸困難、低酸素血症、乾性咳嗽、胸部X線やCTでの異常陰影など間質性肺炎が疑われる症状や検査所見が認められた場合、直ちにステロイドパルス治療など適切な処置を行ってください。

7 進行性多巣性白質脳症(PML)

B細胞性非ホジキンリンパ腫を中心とした国内での市販後の使用において、本剤の投与により進行性多巣性白質脳症(PML)が発現し、死亡に至った症例が報告されています。

意識障害、認知障害、麻痺症状(片麻痺、四肢麻痺)、言語障害等のPMLを疑うべき大脳症状があらわれた場合は先ずMRI検査を施行し、PMLの可能性があると判断される場合は、脳脊髄液中の原因ウイルス(JCウイルス)のDNAを検査します。

脳脊髄液中のJC-DNA検査については、厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事業)「プリオントウマチ病及び遅発性ウイルス感染症に関する調査研究班」による支援の下、国立感染症研究所ウイルス第一部において無料(検体輸送費は除く)で超高感度PCR検査が実施されています。

副作用

発現状況

ループス腎炎を対象とした国内使用実態調査^{14, 15)}においては発現が認められていません。

【参考】

- B細胞性非ホジキンリンパ腫を中心とした、国内の市販後の使用において、PMLは47例報告されています。うち23例については、PMLによって死亡したと報告されています。PMLは現在のところ有効な治療法のない疾患であり、上記死亡例のほか、転帰不明例、未回復例の中にも、PML発症後の死亡例が含まれる可能性があります(2021年11月17日現在)。
- 自己免疫性リウマチ疾患治療^{*1}においてPMLを発症した34例のうち、14例で本剤の投与が行われていたとの海外からの報告があります²²⁾。
- 2002年1月1日から2019年11月17日までの欧州販売承認取得者にて収集されたグローバル安全性データベースで、リツキシマブ関連のPMLが885件報告されました²³⁾。

領域	確定された PML症例数	確定されていない (臨床的に疑われる) PML症例数	合計
自己免疫疾患領域			
関節リウマチ	19	38	57
多発血管炎性肉芽腫症/顕微鏡的多発血管炎	4	8	12
その他自己免疫疾患	51	37	88
がん領域			
慢性リンパ性白血病	126	38	164
非ホジキンリンパ腫	240	165	405
その他のがん領域	36	30	66
その他領域	13	8	21
未知の領域	4	68	72
合計	493	392	885

Reprinted from The Lancet, 8, Bennett CL, Focosi D, Soccal MP, et al., Progressive multifocal leukoencephalopathy in patients treated with rituximab: a 20-year review from the Southern Network on Adverse Reactions, e593-e604, Copyright(2021), with permission from Elsevier.

発現時期(参考データ)

B細胞性非ホジキンリンパ腫を中心とした国内での市販後の使用において、PMLの発現時期は、投与開始後約2ヵ月から6年以上であり、発現時期に一定の傾向は認められていません^{*2}。

発現機序

免疫抑制剤など免疫に影響を及ぼす薬剤の投与などが要因となり、健康人の約80%が潜在的に保有しているJCウイルス(ポリオーマウイルス)の活性化により発現すると考えられます。

対処法

意識障害、認知障害、麻痺症状(片麻痺、四肢麻痺)、言語障害等の症状があらわれた場合は、MRIによる画像診断及び脳脊髄液検査を行うとともに、本剤の投与を中止し、適切な処置を行ってください。

*1：国内未承認

*2：米国の添付文書(2021年12月改訂)には「PML発症症例の多くは、リツキサン最終投与から12ヵ月以内に診断されている。」と記載されています。

8 その他

B細胞性非ホジキンリンパ腫を中心とした国内外での市販後の使用において、以下の症状が発現したとの報告があります。

消化管穿孔・閉塞

本剤の投与により、消化管穿孔・閉塞を発現したとの報告があります。

初期症状である腹痛、腹部膨満感、下血、吐血、貧血等の観察を十分行い、異常が認められた場合は、直ちにX線、CT検査等を実施して出血部位、穿孔・閉塞所見の有無を確認し、適切な処置を行ってください。

可逆性後白質脳症症候群(RPLS)等の脳神経症状

本剤の投与により、可逆性後白質脳症症候群(症状:痙攣発作、頭痛、精神症状、視覚障害、高血圧等)を発現したとの報告があります。また、本剤の治療終了後6カ月までの間に、失明、難聴等の視聴覚障害、感覺障害、顔面神経麻痺等の脳神経障害が報告されています。

患者の状態を十分に観察し、このような症状があらわれた場合は投与を中止し、適切な処置を行ってください。

腎障害

本剤の投与により、腎障害を発現した症例が報告されています。

尿量減少、血清クレアチニンやBUNの上昇などが認められた場合は投与を中止し、適切な処置を行ってください。

肝機能障害、黄疸

ループス腎炎を対象とした国内使用実態調査^{14, 15)}において、重篤な肝障害が1例報告されています。

AST、ALT、AI-P、総ビリルビン等の上昇や黄疸が認められた場合は投与を中止し、適切な処置を行ってください。

心障害

本剤の投与により、心障害を発現した症例が報告されています。

不整脈、狭心症、心筋梗塞等の心機能障害があらわれた場合は直ちに投与を中止して適切な処置を行ってください。

血圧下降

本剤の投与により、血圧下降を発現した症例が報告されています。

本剤投与時に一過性の血圧下降が発現することがあるので、このような症状があらわれた場合は投与を中止して適切な処置を行ってください。

観察期間について

副作用

検査値の変動に留意し、異常が認められた場合には正常化するまで十分に観察を行ってください。
投与開始より6～12ヵ月間はできるかぎり患者の状態を観察してください。

● 不活化ワクチン接種

初回投与の少なくとも4週間前までに接種

「患者ならびにご家族に対する説明」(P10)参照

● Infusion reaction*(投与中～投与終了後翌日)

「特に注意を要する副作用とその対策-①」(P19)参照

*多くは初回点滴静注開始後30分～2時間より24時間以内に発現していることから、投与中は15～30分毎にバイタルサインのチェックと自他覚症状の観察を行うのが望ましい。

● 肝炎ウイルス検査(HBV、HCVのマーカー、ウイルス量)[#]

B型肝炎ウイルスの再活性化による劇症肝炎、肝炎の増悪
(投与開始後～投与終了後12ヵ月)

皮膚粘膜症状
(投与開始後～投与終了後12ヵ月)

● 血液一般検査

汎血球減少、白血球減少、好中球減少、無顆粒球症、
血小板減少(投与終了後～投与終了後8ヵ月)

間質性肺炎
(投与開始後～投与終了後12ヵ月)

感染症(投与開始後～投与終了後12ヵ月)
注)本剤によるBリンパ球や好中球の減少が認められる期間

進行性多巣性白質脳症(PML)
(投与開始後～投与終了後12ヵ月)

投与前

投与開始後
～投与終了後
翌日

投与終了後
1ヵ月

投与終了後
3ヵ月

投与終了後
6ヵ月

投与終了後
12ヵ月

※各事象の詳細ならびに対処法につきましては「特に注意を要する副作用とその対策」(P18～28)の各項もあわせてご参照ください。

※上記事象の多くは発現時期に一定の傾向は認められていません。この期間外であっても、発現に十分注意してください。

#投与前ならびに治療期間中の肝炎ウイルス検査につきましては、日本肝臓学会より発出されている「B型肝炎治療ガイドライン(第4版)」(2022年6月)に準じてご対応ください(P23参照)。

副作用及び臨床検査値異常の発現状況

本剤は公知申請により既存治療で効果不十分なループス腎炎に対する妥当性が評価されたため、企業治験が実施されていません。

【参考】

低悪性度又はろ胞性非ホジキンリンパ腫、マントル細胞リンパ腫を対象にリツキシマブ単剤を1回量375mg/m²にて1週間間隔で4回点滴静注した国内臨床第II相試験における副作用²⁴⁾

ループス腎炎を対象とした国内使用実態調査^{14, 15)}は投与症例数が限られるため、低悪性度リンパ腫を対象とした国内臨床第II相試験における副作用及び臨床検査値異常を以下に示します。

副作用

調査症例数	90例
副作用の発現症例数	88例
副作用の発現件数	362件
副作用の発現率	97.8%

副作用の種類	例数(%)	副作用の種類	例数(%)
皮膚・付属器障害	30(33.3)	呼吸器系障害	19(21.1)
そう痒	25(27.8)	咽頭炎	9(10.0)
発疹	19(21.1)	咳	5 (5.6)
蕁麻疹	3 (3.3)	鼻炎	4 (4.4)
筋・骨格系障害	2 (2.2)	呼吸障害	2 (2.2)
関節痛	2 (2.2)	喘鳴	1 (1.1)
筋肉痛	1 (1.1)	一般的全身障害	78(86.7)
心・血管障害(一般)	33(36.7)	発熱	60(66.7)
血圧上昇	26(28.9)	悪寒(※戦慄含む)	34(37.8)
血圧下降	11(12.2)	頭痛	21(23.3)
心拍数・心リズム障害	25(27.8)	ほてり	16(17.8)
頻脈	23(25.6)	多汗	15(16.7)
心悸亢進	2 (2.2)	虚脱感	15(16.7)
不整脈	1 (1.1)	疼痛	6 (6.7)
血管(心臓外)障害	7 (7.8)	浮腫	5 (5.6)
潮紅(フラッシング)	3 (3.3)	倦怠感	3 (3.3)
血管拡張	3 (3.3)	胸痛	3 (3.3)
末梢性虚血	1 (1.1)	無力症	1 (1.1)
中枢・末梢神経系障害	1 (1.1)	アナフィラキシー様反応	1 (1.1)
眩暈	1 (1.1)	インフルエンザ様症候群	1 (1.1)
異常感覚	1 (1.1)	体重増加	1 (1.1)
消化器系障害	24(26.7)	咽頭浮腫	1 (1.1)
嘔吐	10(11.1)	抵抗機構障害	3 (3.3)
恶心(嘔気)	9(10.0)	帯状疱疹	1 (1.1)
口内乾燥	7 (7.8)	単純疱疹	1 (1.1)
腹痛	4 (4.4)	細菌感染	1 (1.1)
しぶり腹	1 (1.1)		
便秘	1 (1.1)		
下痢	1 (1.1)		

臨床検査値異常

調査症例数	90例
臨床検査値異常の発現症例数	77例
臨床検査値異常の発現件数	172件
臨床検査値異常の発現率	85.6%

臨床検査値異常の種類	例数(%)
血液検査値異常	66(73.3)
白血球減少	50(55.6)
好中球減少	50(55.6)
ヘモグロビン減少	18(20.0)
血小板減少	14(15.6)
血液生化学的検査値異常	24(26.7)
AST(GOT)上昇	10(11.1)
ALT(GPT)上昇	6 (6.7)
AI-P上昇	3 (3.3)
総ビリルビン上昇	3 (3.3)
クレアチニン上昇	1 (1.1)
BUN上昇	4 (4.4)
低Ca血症	1 (1.1)
高血糖*(n=73)	3 (4.1)
低血糖*(n=73)	1 (1.4)
尿酸値上昇	3 (3.3)
尿検査値異常	4 (4.4)
尿糖	2 (2.2)
尿潜血	2 (2.2)
尿蛋白	1 (1.1)

*17例は測定値なし

国内臨床第II相試験で初回投与開始後から観察期間を終了するまでに発現した副作用及び臨床検査値異常について集計した。なお、同一症例に同一副作用が複数回発現した場合は1件とした。

各副作用は「医薬品副作用用語集(1996年)」に基づいて読み替えを行った。

【参考】

未治療のCD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫を対象とした国内臨床第Ⅱ相試験(IDE-C2B8-L7試験)における第1サイクル[高濃度(4mg/mL)投与]の副作用²⁵⁾

調査症例数	32例
副作用の発現症例数	25例
副作用の発現件数	99件
副作用の発現率	78.1%

副作用の種類	例数(%)	
	全Grade*	Grade 3-5*
胃腸障害	4(12.5)	0
悪心	2 (6.3)	0
胃炎	1 (3.1)	0
口唇そう痒症	1 (3.1)	0
口唇腫脹	1 (3.1)	0
一般・全身障害および投与部位の状態	5(15.6)	0
発熱	2 (6.3)	0
浮腫	1 (3.1)	0
倦怠感	1 (3.1)	0
口渴	1 (3.1)	0
感染症および寄生虫症	2 (6.3)	0
上気道感染	1 (3.1)	0
蜂巣炎	1 (3.1)	0
血液およびリンパ系障害	3 (9.4)	3 (9.4)
発熱性好中球減少症	3 (9.4)	3 (9.4)
血管障害	8(25.0)	0
高血圧	5(15.6)	0
潮紅	2 (6.3)	0
ほてり	1 (3.1)	0
呼吸器、胸郭および縦隔障害	7(21.9)	0
口腔咽頭不快感	3 (9.4)	0
鼻閉	2 (6.3)	0
しゃっくり	1 (3.1)	0
喉頭痛	1 (3.1)	0
咳嗽	1 (3.1)	0
鼻漏	1 (3.1)	0
心臓障害	1 (3.1)	0
上室性不整脈	1 (3.1)	0
神経系障害	2 (6.3)	0
頭痛	2 (6.3)	0
代謝および栄養障害	3 (9.4)	0
食欲減退	2 (6.3)	0
脱水	1 (3.1)	0
皮膚および皮下組織障害	10(31.3)	0
そう痒症	5(15.6)	0
紅斑	2 (6.3)	0
発疹	2 (6.3)	0
斑状丘疹状皮疹	1 (3.1)	0
臨床検査	19(59.4)	19(59.4)
好中球数減少	19(59.4)	19(59.4)
白血球数減少	18(56.3)	18(56.3)
リンパ球数減少	5(15.6)	4(12.5)
CD4リンパ球減少	1 (3.1)	1 (3.1)
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1 (3.1)	0
アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	1 (3.1)	0
血中ビリルビン増加	1 (3.1)	0

MedDRA/J(ver20.1)による読み替えを行い集計した。

試験デザイン：未治療の非ホジキンリンパ腫患者(ろ胞性リンパ腫又はびまん性大細胞型B細胞リンパ腫)に、R-CHOPレジメン(リツキシマブ、シクロホスファミド水和物、ドキソルビシン塩酸塩、ビンクリスチン硫酸塩及びプレドニゾロンの併用)による寛解導入療法を実施した国内臨床第Ⅱ相試験。第1サイクルはリツキシマブの希釈濃度を4mg/mLとして投与した。

*効果・安全性評価委員会判定。

Infusion reactionの発現傾向について

(参考：B細胞性非ホジキンリンパ腫のデータより)


副作用

投与回数毎のinfusion reaction

B細胞性非ホジキンリンパ腫を対象とした化学療法(CHOP*)併用の国内臨床第II相試験²⁶⁾において、62例全例にinfusion reactionが発現しました。投与回数毎のinfusion reactionの発現は以下のとおりでした。初回投与時に1症例あたり3.11件の頻度で発現しました(複数の事象を発現した症例がありました)。2回目から8回目の投与時の頻度は1症例あたり0.22件～1.26件でした。

*シクロホスファミド水和物、ドキソルビシン塩酸塩、ビンクリスチン硫酸塩及びプレドニゾロン


●B細胞性非ホジキンリンパ腫を対象とした国内臨床第II相試験²⁶⁾におけるinfusion reactionの発現件数
(投与回別集計)



未治療indolent B細胞性非ホジキンリンパ腫を対象としたリツキシマブ維持療法の国内臨床第II相試験(承認時評価資料)

B細胞性非ホジキンリンパ腫を対象とした国内臨床第II相試験ならびにこれまでに実施された臨床試験等から、本剤におけるinfusion reactionの多くは、最初に注入速度を上げた後の30分間に多く認められています。特に最初に注入速度を上げた後、30～60分の間はご注意ください。

●国内臨床第II相試験²⁶⁾におけるinfusion reactionの発現件数(初回投与時・投与開始後経過時間別集計)



未治療indolent B細胞性非ホジキンリンパ腫を対象としたリツキシマブ維持療法の国内臨床第II相試験(承認時評価資料)

6. 用法及び用量(抜粋)

〈既存治療で効果不十分なループス腎炎〉

通常、リツキシマブ(遺伝子組換え)として1回量375mg/m²を1週間間隔で4回点滴静注する。

血液毒性について

【参考】

CD20陽性B細胞性非ホジキンリンパ腫承認時

低悪性度又はろ胞性非ホジキンリンパ腫、マントル細胞リンパ腫を対象にリツキシマブ単剤を1回量375mg/m²にて1週間間隔で4回点滴静注した国内臨床第Ⅱ相試験²⁷⁾において、評価対象症例90例(再投与時を除く)における血液毒性の主なものは白血球減少50例(55.6%, 2,000/μL未満の白血球減少15.6%)、好中球減少50例(55.6%, 1,000/μL未満の好中球減少20.0%)、血小板減少14例(15.6%, 5万/μL未満の血小板減少3.3%)でした。

低悪性度リンパ腫に対する国内臨床第Ⅱ相試験²⁷⁾における血液毒性

n=90

血液毒性	発現例数 ^{#1}	発現頻度	Grade別発現例数(%) (JCOGの毒性判定基準)			
			G1	G2	G3	G4
白血球減少	50	55.6%	17 (18.9)	19 (21.1)	13 (14.4)	1 (1.1)
好中球減少	50	55.6%	19 (21.1)	13 (14.4)	13 (14.4)	5 (5.6)
血小板減少	14	15.6%	2 (2.2)	9 (10.0)	2 (2.2)	1 (1.1)
ヘモグロビン減少	18	20.0%	9 (10.0)	9 (10.0)	0 (0)	—

血液毒性	最低値 中央値(範囲)	最低値発現までの期間 中央値(範囲)	回復までの期間 ^{#2} 中央値(範囲)
白血球減少	2,510 /μL (900~3,900 /μL)	12.5日 (1~266日)	13日 (3~125日)
好中球減少	1,370 /μL (250~1,980 /μL)	29.5日 (1~266日)	14日 (3~154日)
血小板減少	6.75万 /μL (2万~9.9万 /μL)	2日 (0~201日)	5.5日 (2~42日)
ヘモグロビン減少	9.95 g/dL (9.0~10.9 g/dL)	20日 (1~178日)	7日 (2~63日)

#1 : Japan Clinical Oncology Groupの毒性判定基準により、同一Grade内での変動は「なし」とした。

#2 : 最低値(Nadir)から起算して投与前のGrade1に回復するまでの日数とした。

本剤の好中球減少や血小板減少の発現メカニズムは、抗原抗体反応を介したBリンパ球の傷害とそれに続く一連の免疫応答にFc受容体を有する好中球や血小板等が巻き込まれ、消費されるために発現すると推定されています。特に血液中や骨髄中に腫瘍性B細胞が多い場合、Bリンパ球傷害が急激に進むため、高度的好中球減少や血小板減少が発現しやすくなります。

低悪性度リンパ腫に対する国内臨床第Ⅱ相試験²⁷⁾において、腫瘍細胞の骨髄浸潤例や末梢血中に腫瘍細胞が流出した症例にGrade 3~4の好中球減少や血小板減少が発現しており、このような背景を有する症例に本剤を投与する場合には、投与後の血液検査を定期的に行い、高度的好中球減少や血小板減少の発現を十分モニターする必要があります。

国内使用実態調査^{14, 15)}

「警告・禁忌を含む注意事項等情報」等について
は巻末のDIをご参照ください。

ループス腎炎に対する本剤の使用方法、有効性及び安全性の妥当性については、日本リウマチ学会（JCR）、日本腎臓学会、日本小児リウマチ学会、日本小児腎臓病学会の連携のもとで行われた国内使用実態調査の結果に基づき公知申請により評価されました。そのため、一部承認外の効能又は効果、用法及び用量で本剤を使用した症例、及び国内未承認の薬剤を併用した症例が含まれています。なお、本剤のループス腎炎を対象とした国内臨床試験は実施されていません。

14)医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議 公知申請への該当性に係る報告書：リツキシマブ(遺伝子組換え)(ループス腎炎)

15)Tanaka Y et al: Mod Rheumatol 33:145-153, 2023

本研究は中外製薬を含む複数の製薬企業からの助成金が用いられている。また著者の一部は中外製薬を含む複数の製薬企業からの講師料の提供を受けている。

(1)調査方法

2017年1月から2021年にかけて、JCRリツキシマブ使用調査小委員会が主導する多施設共同、後ろ向き観察研究として実施した。

(2)目的

国内使用実態調査の結果からループス腎炎に対するリツキシマブの使用方法、効果及び安全性を明らかにする。

(3)対象患者

2019年6月までにループス腎炎と診断され、ループス腎炎の治療の目的でリツキシマブの投与を受けた、あるいは受けている患者

■患者背景(症例内訳)

調査患者数	115	
年齢(歳)	平均±SD 中央値(範囲)	34.7±13.1 34.0(11-69)
性別	男性 女性	20(17.4%) 95(82.6%)
ループス腎炎発症から リツキシマブ治療介入までの期間	~1年未満 1年~5年未満 5年~10年未満 10年~20年未満 20年以上 不明	40(34.8%) 20(17.4%) 21(18.3%) 20(17.4%) 6 (5.2%) 8 (7.0%)
組織型分類 (ISN/RPS分類)	I II III IV V III+V IV+V 不明/未実施	1 (0.9%) 8 (7.0%) 12(10.4%) 40(34.8%) 20(17.4%) 5 (4.3%) 10 (8.7%) 19(16.5%)
リツキシマブ治療介入時の ループス腎炎の初発・再発	初発 再発 不明	47(40.9%) 59(51.3%) 9 (7.8%)
他のSLE症状有無	無 有	22(19.1%) 93(80.9%)

調査患者数		115
SLE活動性評価 (SLEDAIスコア)	中央値(範囲)	15.0(0-37)
	~4点未満	4 (3.5%)
	4~10点未満	23(20.0%)
	10~20点未満	34(29.6%)
	20点以上	28(24.3%)
	不明/未実施	26(22.6%)
リツキシマブに先行する SLE・ループス腎炎治療*	無	6 (5.4%)
	有	108(93.9%)
	副腎皮質ステロイド	104(96.3%)
	タクロリムス水和物	33(30.6%)
	ミコフェノール酸 モフェチル	26(24.1%)
	シクロホスファミド	25(23.1%)
	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	15(13.9%)
	シクロスボリン	13(12.0%)
	ミゾリビン	12(11.1%)
	アザチオプリン	7 (6.5%)
	メトレキサート	5 (4.6%)
	その他の治療	14(13.0%)
	不明	1 (0.9%)

4. 効能又は効果(抜粋)
 　○既存治療で効果不十分なループス腎炎
5. 効能又は効果に関連する注意(抜粋)
 　〈既存治療で効果不十分なループス腎炎〉
 　5.4 既存治療(ステロイド、免疫抑制剤等)で十分な効果が得られない患者に対して本剤の投与を考慮すること。また、診療ガイドライン等の最新の情報を参考に、本剤の投与が適切と判断される患者に使用すること。
6. 用法及び用量(抜粋)
 　〈既存治療で効果不十分なループス腎炎〉
 　通常、リツキシマブ(遺伝子組換え)として1回量375mg/m²を1週間間隔で4回点滴静注する。
7. 用法及び用量に関連する注意(抜粋)
 　〈既存治療で効果不十分なループス腎炎〉
 　7.9 原則として副腎皮質ステロイド剤を併用すること。

*)一部国内承認外を含みます。各薬剤の警告・禁忌を含む注意事項等情報等に関する詳細は各製品の電子化された添付文書をご参照ください。

(4)投与方法

1回当たりのリツキシマブ投与量は、375mg/m²が41例(35.7%)、500mg/bodyが36例(31.3%)、600mg/bodyが6例(5.2%)、700mg/bodyが1例(0.9%)、1,000mg/bodyが31例(27.0%)であった。

115例中114例でステロイド、1例でステロイドパルスが併用された。また90例については免疫抑制剤^{*1}あるいはシクロホスファミド水和物が併用された。

※本剤の投与方法につきましては「リツキサンの投与について」(P14~16)をご参照ください。

■1回当たりのリツキシマブ投与量

	実際の投与量	体表面積当たりの投与量に換算		例数	割合(%)
		中央値 (mg/m ²)	範囲 (mg/m ²)		
1回当たりの投与量	375mg/m ²	—	—	41	35.7
	500mg/body	341	288-397	36	31.3
	600mg/body	368	359-393	6	5.2
	700mg/body	342	—	1	0.9
	1,000mg/body	642	547-833	31	27.0

■1コース当たりのリツキシマブ投与回数とコース数

1コース当たりの投与回数	投与回数/コース	コース数	例数	割合
1回当たり375mg/m ² を 1週間間隔で投与 ^{*2}	4	1	54	47.0%
	3	2	1	0.9%
	2	5	1	0.9%
	2	2	2	1.7%
	2	1	22	19.1%
	1	2	2	1.7%
	1	1	2	1.7%
1回当たり1,000mg/bodyを 2週間間隔で投与	2	3	1	0.9%
	2	2	11	9.6%
	2	1	16	13.9%
	1	2	1	0.9%
	1	1	2	1.7%

■リツキシマブに併用した薬剤の種類と投与量

	例数	リツキシマブ 治療開始時 1日投与量(mg/日) 平均±SD	有効性評価時 1日投与量(mg/日) 平均±SD
副腎皮質ステロイド 〔プレドニゾロン換算量〕	114	39.1±27.4	13.9±9.1
高用量副腎皮質ステロイド 〔プレドニゾロン換算量〕	1	156.3(週1回×2回)	0.0
シクロホスファミド水和物静注療法	1	1200(単回)	—
	1	500(月1回×2回)	—
	1	800(月毎)	600(月毎)
免疫抑制剤 ^{*1}	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	13	192.3±144.1
	ミコフェノール酸モフェチル	27	963.0±921.7
	タクロリムス水和物	23	2.1±1.5
	アザチオプリン	9	57.3±66.5
	ミゾリビン	8	134.9±109.3
	シクロスボリン	5	124.0±121.0
	メトトレキサート	2	11.0±1.4(週毎)

*1：一部国内承認外を含みます。各薬剤の警告・禁忌を含む注意事項等情報等に関する詳細は各製品の電子化された添付文書をご参照ください。

*2：身長・体重から計算される体表面積で1回投与量に換算した結果リツキシマブの1回当たり投与量が500mg/body、600mg/body、700mg/bodyだった症例はリツキシマブ375mg/m²群として集計

- 4. 効能又は効果(抜粋)
 - 既存治療で効果不十分なループス腎炎
- 5. 効能又は効果に関連する注意(抜粋)
 - 〈既存治療で効果不十分なループス腎炎〉
 - 5.4 既存治療(ステロイド・免疫抑制剤等)で十分な効果が得られない患者に対して本剤の投与を考慮すること。また、診療ガイドライン等の最新の情報を参考に、本剤の投与が適切と判断される患者に使用すること。
- 6. 用法及び用量(抜粋)
 - 〈既存治療で効果不十分なループス腎炎〉
 - 通常、リツキシマブ(遺伝子組換え)として1回量375mg/m²を1週間間隔で4回点滴静注する。
- 7. 用法及び用量に関連する注意(抜粋)
 - 〈既存治療で効果不十分なループス腎炎〉
 - 7.9 原則として副腎皮質ステロイド剤を併用すること。

(5)評価項目

- ・有効性：(1)臨床検査値のベースライン(リツキシマブ治療開始時)と最終観測値(有効性評価時)の推移
(2)腎反応(JCRリツキシマブ使用調査小委員会作成基準-I、作成基準-II)
- ・安全性

(6)解析方法

有効性評価において、ベースライン(リツキシマブ治療開始時)と治療開始から6ヵ月(±3ヵ月)を目安にした最終観測値(有効性評価時)の要約統計量を算出した。また、腎反応の割合を算出した。

(7)有効性判定基準

腎反応：JCRリツキシマブ使用調査小委員会が作成した基準(基準-I、基準-II)に基づき、完全寛解率(CRR)、部分寛解率(PRR)、または無奏効率(NR)のいずれかに分類した。また、全寛解率(ORR)はCRRとPRRの合計として定義した。

- ・基準-I(JCR-I)：ACRガイドラインの寛解基準に基づき作成された(尿中白血球は効果判定基準の構成要素として含まない)。
- ・基準-II(JCR-II)：LUNAR試験の寛解基準に基づき作成された。

■腎反応基準

JCRリツキシマブ使用調査小委員会作成基準-I(ACR寛解基準^{*1}を基に作成)

1. Complete renal response(CRR)：以下のすべてを満たす場合

- ・eGFRの≥25%上昇(ベースライン値が異常値を示す場合)
- ・活動性尿沈渣の消失(赤血球数<5個/hpf、かつ赤血球円柱を認めない)
- ・尿蛋白値≥50%の改善によるUpr/Ucr比の0.2への減少

2. Partial renal response(PRR)：以下のすべてを満たす場合

- ・eGFRがベースライン値の≥75%を維持
- ・活動性尿沈渣の消失(赤血球数<5個/hpf、かつ赤血球円柱を認めない)
- ・尿蛋白値≥50%の改善によるUpr/Ucr比の0.2～2.0への減少

JCRリツキシマブ使用調査小委員会作成基準-II(LUNAR試験の寛解基準^{*2}を基に作成)

1. Complete renal response(CRR)：以下のすべてを満たす場合

- ・血清クレアチニン値の正常化(ベースライン値が異常値を示す場合)、またはベースライン値の≤115%(ベースライン値が正常値を示す場合)
- ・活動性尿沈渣の消失(赤血球数<5個/hpf、かつ赤血球円柱を認めない)
- ・Upr/Ucr比が<0.5

2. Partial renal response(PRR)：以下のすべてを満たす場合

- ・血清クレアチニン値がベースライン値の≤115%
- ・尿沈渣の改善(赤血球数の≥50%改善、赤血球円柱を認めない)
- ・Upr/Ucrの≥50%の改善(但し、ベースラインのUpr/Ucrが≤3.0であった場合は<1.0まで低下、ベースラインのUpr/Ucrが>3.0であった場合は≤3.0まで低下の条件を満たす)

*1 : Renal Disease Subcommittee of the American College of Rheumatology Ad Hoc Committee on Systemic Lupus Erythematosus Response Criteria. The American College of Rheumatology response criteria for proliferative and membranous renal disease in systemic lupus erythematosus clinical trials. Arthritis Rheum 2006; 54(2): 421-432.

*2 : Rovin, BH et al. Efficacy and safety of rituximab in patients with active proliferative lupus nephritis: the Lupus Nephritis Assessment with Rituximab study. Arthritis Rheum 2012; 64(4): 1215-1226.

(8)有効性

1)臨床検査値のベースライン(リツキシマブ治療開始時)と最終観測値(有効性評価時)の推移

各臨床検査所見は以下のとおりであった。

■臨床検査値

		例数	リツキシマブ 治療開始時 (平均±SD)	有効性評価時 (平均±SD)
血液・血液生化学	白血球数 ($\times 10^3/\mu\text{L}$)	115	6.9±3.5	7.2±3.0
	赤血球数 ($\times 10^4/\mu\text{L}$)	115	363.8±73.5	408.2±67.7
	血小板数 ($\times 10^4/\mu\text{L}$)	115	19.6±11.2	24.4±9.9
	血清タンパク (g/dL)	112	5.9±1.4	6.3±1.6
	血清アルブミン (g/dL)	115	3.0±0.8	3.8±0.6
	血清クレアチニン (mg/dL)	115	1.10±1.02	1.01±0.92
尿	尿蛋白(定量) (g/日)	17	3.32±3.15	1.76±2.82
	尿蛋白/クレアチニン比 (g/gCr)	59	3.01±3.40	1.03±1.33
	尿蛋白(定性)	112		
	—		14	41
	±		8	15
	1+		21	23
	2+		26	19
	3+		38	13
	4+		5	1
	尿潜血	113		
腎機能	CCr (mL/分)	6	72.0±21.6	72.4±22.2
	eGFR (mL/min/1.73m ²)	115	76.9±41.4	75.5±35.4
SLE serology	C3 (mg/dL)	94	64.0±27.9	86.0±25.7
	C4 (mg/dL)	91	14.4±9.2	21.8±9.6
	CH50 (U/mL)	103	33.8±16.4	43.5±13.8
	赤沈 (mm/時)	64	39.4±34.1	22.1±19.5
	抗ds-DNA IgG (IU/mL)	86	89.7±157.8	21.2±48.6
免疫グロブリン	IgG (mg/dL)	103	1205.8±812.5	870.0±374.7
	IgA (mg/dL)	44	259.5±158.9	186.9±108.1
	IgM (mg/dL)	43	132.9±150.4	60.4±52.3

CCr : クレアチニンクリアランス

eGFR : 推算糸球体濾過量

C3、C4 : 補体第3成分、補体第4成分

CH50 : 血清補体値

IgG : 免疫グロブリンG


IgA : 免疫グロブリンA

IgM : 免疫グロブリンM


2)腎反応(JCRリツキシマブ使用調査小委員会作成基準-I、作成基準-II)

JCRリツキシマブ使用調査小委員会作成基準-Iの全寛解率(ORR : CRR+PRR)はリツキシマブ375mg/m²群*で54.2%(95%CI : 42.0-66.0%)であり、JCRリツキシマブ使用調査小委員会作成基準-IIでは48.6%(95%CI : 36.7-60.7%)であった。(1,000mg/body投与した群は用法及び用量が国内承認外であるため、承認範囲内の投与群のみに限定し一部改変)

■腎反応(JCRリツキシマブ使用調査小委員会作成基準-Iによる)



■腎反応(JCRリツキシマブ使用調査小委員会作成基準-IIによる)



*身長・体重から計算される体表面積で1回投与量に換算した結果リツキシマブの1回当たり投与量が500mg/body、600mg/body、700mg/bodyだった症例はリツキシマブ375mg/m²群として集計

6. 用法及び用量(抜粋)

〈既存治療で効果不十分なループス腎炎〉

通常、リツキシマブ(遺伝子組換え)として1回量375mg/m²を1週間間隔で4回点滴静注する。

(9) 安全性

リツキシマブに関連する副作用は、115例中25例(21.7%)に45件報告された。このうち重篤な副作用は8例(7.0%)に12件報告された。なお、医師の判断により重篤性が評価された。

発現頻度の高かった副作用はinfusion reaction(6例(5.2%)、11件)及び感染症(12例(10.4%)、15件)であった。重篤なinfusion reactionは同一症例に発現した発熱、関節痛、悪寒、浮腫、発疹各1件、重篤な感染症は硬膜外膿瘍、細菌性腸炎、ニューモシスチス・イロベチイ肺炎各1件であった。この他、重篤な副作用は肝障害、脳梗塞、汎血球減少症、無顆粒球症各1件であった。

副作用発現率はリツキシマブ375mg/m²群^{*1}では17例25件(20.2%、17/84例)、1,000mg/body群では8例20件(25.8%、8/31例)であった。本調査での投与中止例は3例(いずれも事象不明^{*2})であった。本調査での死亡例は報告されなかった。

■ 副作用

有害事象(副作用)	例数(合計)			リツキシマブ 375mg/m ² 群 ^{*1}			リツキシマブ 1,000mg/body群		
	有	無	計	有	無	計	有	無	計
infusion reaction	25	90	115	17	67	84	8	23	31
発熱	6	5	11	5	0	5	1	5	6
関節痛	1	1	2	1	0	1	0	1	1
悪寒	0	1	1	0	0	0	0	1	1
浮腫	0	1	1	0	0	0	0	1	1
発疹	0	1	1	0	0	0	0	1	1
恶心	1	0	1	0	0	0	1	0	1
咽喉刺激感	1	0	1	1	0	1	0	0	0
口腔咽頭痛	1	0	1	1	0	1	0	0	0
その他(事象名の報告なし)	2	0	2	2	0	2	0	0	0
感染症	12	3	15	9	2	11	3	1	4
帯状疱疹	2	0	2	2	0	2	0	0	0
硬膜外膿瘍	0	1	1	0	1	1	0	0	0
細菌性腸炎	0	1	1	0	0	0	0	1	1
ニューモシスチス・イロベチイ肺炎	0	1	1	0	1	1	0	0	0
クロストリジウム・ディフィシレ大腸炎	1	0	1	1	0	1	0	0	0
インフルエンザ	1	0	1	0	0	0	1	0	1
上咽頭炎	1	0	1	1	0	1	0	0	0
骨髄炎	1	0	1	0	0	0	1	0	1
肺炎	1	0	1	1	0	1	0	0	0
尿路感染	1	0	1	1	0	1	0	0	0
サイトメガロウイルス性腸炎	1	0	1	1	0	1	0	0	0
感染性腸炎	1	0	1	0	0	0	1	0	1
サイトメガロウイルス血症	1	0	1	1	0	1	0	0	0
細菌性肺炎	1	0	1	1	0	1	0	0	0
発熱	1	0	1	0	0	0	1	0	1
腹痛	4	0	4	0	0	0	4	0	4
肝障害	1	1	2	1	0	1	0	1	1
脳梗塞	0	1	1	0	0	0	0	1	1
関節痛	1	0	1	0	0	0	1	0	1
腸炎	1	0	1	0	0	0	1	0	1
頭痛	1	0	1	1	0	1	0	0	0
浮動性めまい	1	0	1	0	0	0	1	0	1
不正子宮出血	1	0	1	1	0	1	0	0	0
血小板数減少	2	0	2	2	0	2	0	0	0
汎血球減少症	2	0	2	2	0	2	0	0	0
無顆粒球症	0	1	1	0	1	1	0	0	0
低γグロブリン血症	2	0	2	2	0	2	0	0	0

*1：身長・体重から計算される体表面積で1回投与量に換算した結果リツキシマブの1回当たり投与量が500mg/body、600mg/body、700mg/bodyだった症例はリツキシマブ375mg/m²群として集計

*2：本調査は本剤の使用実態を後ろ向きに調査したものであるため、投与中止は記録されたが、個々の事象については報告されなかった。安全性情報の詳細は電子化された添付文書またはドラッグインフォメーションを参照のこと。



◆調製について



リツキサンの希釀濃度による安全性に違いはありますか？

A

本剤の希釀濃度ごとの安全性を比較した臨床試験は実施されておりませんが、未治療の非ホジキンリンパ腫患者を対象とした国内臨床第Ⅱ相試験（IDE-C2B8-L7試験）において、第1サイクルに本剤を4mg/mLで投与した際に、1mg/mL（10倍希釀）で投与した際と明らかな安全性の違いは認められませんでした（第1サイクルに本剤を4mg/mLで投与した際の安全性プロファイルはP31参照）。

しかし、これまでの本剤の使用経験から、本剤の注入速度とinfusion reaction等の副作用の発現に相関があることがわかっています。本剤の投与方法は単位時間当たりの本剤の投与量（mg/時）が設定されていることから、希釀濃度にかかわらず本剤の注入速度に変更はありませんが、希釀操作の誤り等により、急速に本剤が静注されることのないよう、希釀濃度と注入速度にご注意ください。



希釀後はいつまで使用できますか？

A

希釀後は直ちに使用し、室温での保管が24時間を超える場合には使用しないでください。

（米国添付文書には、「投与用に調製した本剤は、2～8℃で24時間、さらに追加して23℃以下の室温で24時間安定であるが、防腐剤を含まないため、2～8℃で冷蔵保存すること」と記載されています。）

◆患者の選定について



ループス腎炎患者のうち、本剤投与の対象となるのはどのような患者ですか？

A

本剤はループス腎炎患者のうち、既存治療で効果不十分と考えられる患者に投与してください。また、診療ガイドライン等の最新の情報を参考に、本剤の投与が適切と判断される患者に使用してください。



本剤投与の指標となるガイドライン等はありますか？



ループス腎炎のガイドラインについては、国内においては「厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業 自己免疫疾患に関する調査研究(自己免疫班)」、日本リウマチ学会、全身性エリテマトーデス診療ガイドライン2019¹⁾、海外においては「米国リウマチ学会ガイドライン(American College of Rheumatology guidelines for screening, treatment, and management of lupus nephritis)²⁾」「EULAR/ERA-EDTA推奨事項(2019 Update of the Joint European League Against Rheumatism and European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association(EULAR/ERA-EDTA) recommendations for the management of lupus nephritis)³⁾」「全身性エリテマトーデス管理に関するEULAR勧告(2019 Update of the EULAR recommendations for the management of systemic lupus erythematosus)⁴⁾」「小児発症性ループス腎炎の診断と治療に関する欧州推奨事項(European evidence-based recommendations for the diagnosis and treatment of childhood-onset lupus nephritis: the SHARE initiative)⁵⁾」等が発表されています。また感染症の予防については「ANCA関連血管炎診療ガイドライン2023⁶⁾」「小児特発性ネフローゼ症候群診療ガイドライン2020⁷⁾」等をご参照ください。



小児のループス腎炎に対して、リツキサンを投与することはできますか？



公知申請の審査対象計115例には小児例3例(調査開始時11歳2例、14歳1例)が含まれていますが、〈9. 特定の背景を有する患者に関する注意〉には「9.7.2 低出生体重児、新生児、乳児を対象とした臨床試験は実施していない。」と明示されており、有効性及び安全性が確立されていません。従いまして小児に対する投与については、本剤投与におけるリスク・ベネフィットを考慮の上、慎重にご判断ください。

◆投与方法について



投与前に準備しておいた方がよいことはありますか？



気管支痙攣、アナフィラキシー等が生じることがあるので、緊急事態に即応できる態勢(酸素吸入の用意等)をとった上で、抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤、気管支拡張剤、強心剤、副腎皮質ホルモン剤等の薬剤を用意することが望ましいです。



フィルター付きのルートを使用してもよいですか？



日本における臨床試験⁸⁾では、テルモ社製の孔径0.2μmのインラインフィルター(テルフュージョン®ファイナルフィルターPS)の使用経験があり、経験の範囲内では問題はありませんでした。

Q

既に確保されているルートを他剤投与後に使用してもよいですか？

A

原則的には残液が存在しなければ可能と考えられますが、本剤はpHの変化による影響を受けやすい性質を有していますので、生理食塩液などでルート全体をフラッシングの上、本剤を投与してください。

Q

別ルートで他剤の同時投与をしてもよいですか？

A

別ルートでの同時投与の使用経験はなく、また、薬剤により副作用発現時の対処法が異なるため、別ルートであっても同時投与は行わないでください。

なお、本剤が凝集あるいは分解するおそれがあるため、他剤との混注を禁止しています。

Q

点滴静注にかかる時間はどれくらいですか？

A

B細胞性非ホジキンリンパ腫を対象とした国内臨床第Ⅱ相試験²⁶⁾における投与回数毎の点滴所要時間は下表の通りです。

初回投与時	2時間50分～6時間54分(中央値 3時間33分)
2回目	2時間0分～5時間30分(中央値 2時間27分)
3回目	2時間5分～2時間51分(中央値 2時間24分)
4回目	2時間0分～3時間4分(中央値 2時間25分)
5回目	2時間5分～2時間56分(中央値 2時間25分)
6回目	1時間55分～3時間5分(中央値 2時間25分)
7回目	2時間5分～3時間15分(中央値 2時間26分)
8回目	2時間0分～2時間59分(中央値 2時間25分)

Q

点滴時間を短縮するために注入速度を上げてもよいですか？

A

注入速度とinfusion reaction等の副作用の発現に相関がみられているので、電子化された添付文書に記載されている注入速度を超えて投与しないでください。

Q

標準的な注入速度よりも速度を遅くしてもよいですか？

A

注入速度とinfusion reaction等の副作用の発現に相関がみられているので、患者の状態によっては、注入速度を遅くする必要があります。このような場合にも、患者の状態を十分に観察してください。



点滴漏れに対する対処法は?



本剤は、免疫グロブリン製剤であること、pH 6.5 ± 0.3 、浸透圧比は約1に調整されていることから、化学療法のような皮膚や皮下組織の障害が生じる可能性は低いと考えられます。もしも発赤・腫脹が発現した場合には、必要に応じて外用剤(抗炎症剤、ステロイド剤等)による一般的な対処を行ってください。BC Cancer Agency²⁸⁾の血管外漏出時の組織障害に基づくリスク分類では、本剤はノンビシカント(非壊死性)に分類されます。



免疫抑制剤やシクロホスファミドとの併用は可能ですか?



ループス腎炎を対象とした国内使用実態調査において、115例中90例で何らかの免疫抑制剤(国内承認外を含む)やシクロホスファミドが併用されていました。しかしながら、本剤と免疫抑制剤やシクロホスファミドを併用した際の安全性、有効性は検討されていません。過度の免疫抑制作用による感染症誘発の危険性があるため、併用に際してはリスク・ベネフィットを十分考慮してください。

◆安全性について



Infusion reactionとアナフィラキシーとはどう違うのですか?



Infusion reactionはアナフィラキシーとは異なり、初回投与時と比較して2回目以降の投与時には、投与回数の増加に伴い症状の発現頻度が低下し、症状の程度も軽減する傾向が認められています。



感染症の発現時期には一定の傾向はみられないとありますか? 病原体別による発現時期の違いはありますか?



B細胞性非ホジキンリンパ腫を中心とした国内での市販後の使用において、重篤な感染症(肝炎ウイルスを除く)が987例報告されています。発現日までの期間が算出できる554例における病原体別の発現時期を示します(2021年11月17日現在)。

病原体	症例数 ¹	発現時期 ²	
		中央値(日)	範囲
ウイルス ³	216	96	1日～6年
細菌	138	64.5	4日～6年
真菌	77	86	8日～約4年半
原虫・藻類	5	240	31日～510日
不明	173	65	1日～約6年7ヶ月

*1：重複感染例が存在するため、各病原体の和は554例と一致していません。

*2：本剤投与開始から発現までの期間(発現時期が判明している554例のデータ)

*3：肝炎ウイルス感染を除きます。



ニューモシスチス肺炎の発現時期に一定の傾向は認められますか？

A

一定の傾向は認められていません。国内使用実態調査では重篤1例が報告され、本剤投与開始2ヵ月後の発現でした。他の適応での使用例を含め、本剤投与後重篤なニューモシスチス肺炎を発現した症例100例（転帰：回復45例、軽快18例、未回復1例、死亡21例、不明15例）のうち、発現日までの期間が算出できる42例における発現時期中央値は87日（範囲14日～1,653日）でした。感染リスクの高い患者ではST合剤を投与するなど、必要に応じて、適切な予防措置を検討してください（2021年11月17日現在）。



結核の発現時期に一定の傾向は認められますか？

A

一定の傾向は認められていません。本剤投与後に重篤な結核を発現した症例7例（転帰：回復・軽快6例、未回復1例）のうち、発現日までの期間が算出できる5例における発現時期中央値は114日（範囲7日～229日）でした。結核の曝露歴・既往歴のある患者、IFN- γ 遊離試験陽性の患者などでは、潜在性結核の治療のための抗結核薬投与などを検討してください。



感染症の予防として、どのような対策がありますか？

A

感染症リスクを把握した上で必要に応じ、抗結核薬、ST合剤、抗真菌薬の投薬を考慮してください。詳細は「ANCA関連血管炎診療ガイドライン2023⁶⁾」「小児特発性ネフローゼ症候群診療ガイドライン2020⁷⁾」等をご参照ください。なお、一部予防的投与には保険承認となっていない薬剤もありますので、各薬剤の電子化された添付文書をご参照ください。



従来はHBs抗原陽性例がB型肝炎増悪のリスク群とされてきましたが、リツキサンを使用する場合は、この他どのような患者に注意する必要がありますか？

A

HBs抗原陰性であっても、HBc抗体又はHBs抗体陽性の患者ではB型肝炎増悪に対する注意が必要です²⁹⁾。

化学療法を施行したHBs抗原陰性の悪性リンパ腫患者244例中HBc抗体又はHBs抗体が陽性の8例でHBVの再活性化による肝炎を発症、本剤とステロイドを含む化学療法での発現率が12.2%（6/49例）に対し、本剤とステロイドを含まない化学療法では1.0%（2/195例）であり、本剤とステロイドを含む化学療法がB型肝炎発症のリスクファクターであったとする報告があります³⁰⁾。

また国内での市販後の使用において289例に劇症肝炎、重篤な肝炎、肝不全等が発現しており、このうち154例がHBs抗原陰性からの発症でした（2021年11月17日現在）。



B型肝炎増悪の早期診断には、どのような検査が有用ですか？



ALT上昇、肝炎増悪に先行してHBV-DNA量が上昇するとの報告^{29, 30)}があり、HBV-DNA量の定期的な測定が有用であると考えられます。



B型肝炎ウイルス再活性化予防のためのガイドラインなどはありますか？



B型肝炎増悪の予防として、厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性の肝・胆道疾患に対する調査研究」班及び同肝炎等克服緊急対策研究事業「肝硬変を含めたウイルス性肝疾患の治療の標準化に関する研究」班より「免疫抑制・化学療法により発症するB型肝炎対策ガイドライン」(2019年3月改訂)が、また日本肝臓学会より「B型肝炎治療ガイドライン(第4版)」(2022年6月)が示されています。投与にあたっては本ガイドラインをご熟読ください(P23参照)。



進行性多巣性白質脳症(PML)診断のためには、どのような検査を行う必要がありますか？



意識障害、認知障害、麻痺症状(片麻痺、四肢麻痺)、言語障害等のPMLを疑うべき大脑症状があらわれた場合は先ずMRI検査を行い、PMLの可能性があると判断される場合は、脳脊髄液中の原因ウイルス(JCウイルス)のDNAを検査します。詳細は「進行性多巣性白質脳症(PML)診療ガイドライン2020³¹⁾」をご参考の上、PML治療のご検討をお願い致します。

◆ワクチン接種について



リツキサンによる治療中に生ワクチンを接種できますか？

A

ループス腎炎*の患者は原疾患ならびに前治療や本剤の投与により免疫抑制状態になりやすく、そのような患者に対する生ワクチン接種の効果及び安全性については確立していません。そのため、ワクチン接種による有益性が不利益を上回ると考えられる場合のみ接種を検討するのが望ましいと考えられます。

*本剤の承認された効能又は効果は既存治療で効果不十分なループス腎炎

ワクチン接種については「患者ならびにご家族に対する説明」の項(P10)もあわせてご参照ください。

Q & A



リツキサンの投与を予定している患者に不活化ワクチンを接種する場合、いつ行うべきですか？

A

海外における本剤の自己免疫疾患*1に対する投与において、本剤の初回投与の少なくとも4週間前までにワクチンの接種を行うことが推奨されています³²⁾。

ワクチン接種に関する考え方につきましては「患者ならびにご家族に対する説明」(P10)もあわせてご参照ください。

*1：国内未承認の疾患も含みます。



リツキサンによる治療を受けた患者がインフルエンザワクチンの接種を希望していますが、予防効果は期待できますか？

A

本剤などの抗体を含む治療を受けているリンパ腫患者では、インフルエンザワクチン接種への反応が著しく劣るとの報告¹²⁾が、さらに、R-CHOP治療中ないしは治療終了後11ヵ月以内のリンパ腫患者に対してワクチンを接種したところ、新規インフルエンザ・ウイルス株に対する抗体価の上昇が認められなかったとの報告³³⁾があります。

本剤投与終了後18ヵ月以内の患者では、ワクチン接種時のCD19陽性細胞数にかかわらず、十分な抗体価の上昇が認められない株が存在したとの報告³⁴⁾があります。

参考文献

- 1)厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業 自己免疫疾患に関する調査研究班、日本リウマチ学会: 全身性エリテマトーデス診療ガイドライン2019
- 2)Hahn BH et al: Arthritis Care Res 64: 797-808, 2012
- 3)Fanouriakis A et al: Ann Rheum Dis 79: 713-723, 2020
- 4)Fanouriakis A et al: Ann Rheum Dis 78: 736-745, 2019
- 5)Noortje Groot N et al: Ann Rheum Dis 76: 1965-1973, 2017
- 6)厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事業) ANCA関連血管炎診療ガイドライン2023
- 7)日本小児腎臓病学会編 小児特発性ネフローゼ症候群診療ガイドライン2020
- 8)再発・再燃又は治療抵抗性indolent B細胞リンパ腫を対象としたIDE-C2B8単剤の反復4回投与による国内臨床第II相試験(4回投与)(承認時評価資料)
- 9)Dervite I et al: N Engl J Med 344: 68-69, 2001
- 10)Maloney DG et al: Blood 90: 2188-2195, 1997
- 11)2005年3月 使用成績調査最終結果(調査対象: CD20陽性の低悪性度又はろ胞性B細胞性非ホジキンリンパ腫、マントル細胞リンパ腫)
- 12)Ljungman P et al: Br J Haematol 130: 96-98, 2005
- 13)Krysko KM et al: Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm 7: e637, 2020
- 14)医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議公知申請への該当性に係る報告書: リツキシマブ(遺伝子組換え)(ループス腎炎)
- 15)Tanaka Y et al: Mod Rheumatol 33: 145-153, 2023
- 16)低悪性度又はろ胞性B細胞性非ホジキンリンパ腫、マントル細胞リンパ腫を対象とした国内臨床第II相試験(4回投与)及び中・高悪性度B細胞性リンパ腫を対象とした国内臨床第II相試験(8回投与)(承認時評価資料)
- 17)再発・再燃又は治療抵抗性B細胞性リンパ腫患者を対象とした反復4回投与国内臨床第I相試験(4回投与)(承認時評価資料)
- 18)再発・治療抵抗性のaggressive B細胞リンパ腫を対象としたIDE-C2B8単剤の国内臨床第II相試験(8回投与)(承認時評価資料)
- 19)CD20陽性の低悪性度又はろ胞性非ホジキンリンパ腫、マントル細胞リンパ腫を対象とした特別調査(再投与)(再審査申請時資料)
- 20)低悪性度リンパ腫に対する国内臨床第II相試験(90例)及び中・高悪性度B細胞性リンパ腫に対する国内臨床第II相試験(67例)(承認時評価資料)
- 21)中・高悪性度非ホジキンリンパ腫に対する国内臨床第II相試験(67例)(承認時評価資料)
- 22)Molloy ES et al: Arthritis Rheum 64: 3043-3051, 2012
- 23)Bennett CL et al: Lancet Haematol 8(8): e593-e604, 2021
- 24)IDE-C2B8 国内臨床試験の概要(全薬工業株式会社 社内資料)(承認時評価資料)
- 25)IDE-C2B8 CD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫国内臨床試験及び海外臨床試験の概要(社内資料)
- 26)未治療indolent B細胞性非ホジキンリンパ腫を対象としたリツキシマブ維持療法の国内臨床第II相試験(承認時評価資料)
- 27)低悪性度又はろ胞性非ホジキンリンパ腫、マントル細胞リンパ腫を対象とした国内臨床第II相試験(4回投与)(承認時評価資料)
- 28)BC Cancer Agency <http://www.bccancer.bc.ca/>(2023年7月閲覧)
- 29)楠本茂 他: 血液・腫瘍科 54: 737-742, 2007
- 30)Hui CK et al: Gastroenterology 131: 59-68, 2006
- 31)進行性多巣性白質脳症(progressing multifocal leukoencephalopathy: PML)診療ガイドライン 2020: http://prion.umin.jp/guideline/guideline_PML_2020.pdf(2023年7月閲覧)
- 32)Company Core Data Sheet(CCDS: 企業中核データシート)Ver. 10.0
- 33)Takata T et al: J Clin Exp Hematopathol 49: 9-13, 2009
- 34>Oren S et al: Ann Rheum Dis 67: 937-941, 2008

抗CD20モノクローナル抗体

日本標準商品分類番号

874291

リツキサン[®]

点滴静注 100mg

リツキサン[®]

点滴静注 500mg

販売名	リツキサン点滴静注 100mg リツキサン点滴静注 500mg Rituxan Intravenous Infusion		
一般名	リツキシマブ(遺伝子組換え) Rituximab(Genetical Recombination)		
承認番号	100mg : 23000AMX00185 500mg : 23000AMX00186		
製造販売元	全薬工業株式会社		
規制区分	生物由来製品 処方箋医薬品 ^{注)} ^{注)} 注意—医師等の処方箋により使用すること	100mg	500mg
貯法	凍結を避け2~8°Cに保存		
有効期間	36箇月		
薬価収載	2018年6月	販売開始	2001年9月
効能追加	2022年6月	国際誕生	1997年11月

1. 警告

1.1 本剤の投与は、緊急時に十分に対応できる医療施設において、適応疾患の治療又は臓器移植に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤の使用が適切と判断される症例のみに行うこと。また、治療開始に先立ち、患者又はその家族に有効性及び危険性を十分に説明し、同意を得てから投与を開始すること。

1.2 本剤の投与開始後30分～2時間よりあらわれるinfusion reactionのうちアナフィラキシー、肺障害、心障害等の重篤な副作用（低酸素血症、肺浸潤、急性呼吸促迫症候群、心筋梗塞、心室細動、心原性ショック等）により、死亡に至った例が報告されている。これらの死亡例の多くは初回投与後24時間以内にみられている。また、本剤を再投与した時の初回投与後にも、これらの副作用があらわれるおそれがある。本剤投与中はバイタルサイン（血圧、脈拍、呼吸数等）のモニタリングや自他覚症状の観察を行うとともに、投与後も患者の状態を十分観察すること。特に以下の患者については発現頻度が高く、かつ重篤化しやすいので注意すること。[7.1、7.2、7.8、8.1、9.1.2、11.1.1 参照]

- ・ 血液中に大量の腫瘍細胞がある(25,000/ μ L以上)など腫瘍量の多い患者
- ・ 脾腫を伴う患者
- ・ 心機能、肺機能障害を有する患者

1.3 腫瘍量の急激な減少に伴い、腎不全、高カリウム血症、低カルシウム血症、高尿酸血症、高リン血症等の腫瘍崩壊症候群(tumor lysis syndrome)があらわれ、本症候群に起因した急性腎障害による死亡例及び透析が必要となった患者が報告されている。血液中に大量の腫瘍細胞がある患者において、初回投与後12～24時間以内に高頻度に認められることから、急激に腫瘍量が減少した患者では、血清中電解質濃度及び腎機能検査を行うなど、患者の状態を十分観察すること。また、本剤を再投与した時の初回投与後にも、これらの副作用があらわれるおそれがある。[8.2、11.1.2 参照]

1.4 B型肝炎ウイルスキャリアの患者で、本剤の治療期間中又は治療終了後に、劇症肝炎又は肝炎の増悪、肝不全による死亡例が報告されている。[8.3、9.1.3、11.1.3 参照]

1.5 皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、中毒性表皮壞死溶解症(Toxic Epidermal Necrolysis: TEN)等の皮膚粘膜症状があらわれ、死亡に至った例が報告されている。[11.1.5 参照]

1.6 間質性肺炎を合併する全身性強皮症患者で、本剤の投与後に間質性肺炎の増悪により死亡に至った例が報告されている。[2.2、9.1.9、11.1.9 参照]

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

（効能共通）

2.1 本剤の成分又はマウスタンパク質由来製品に対する重篤な過敏症又はアナフィラキシーの既往歴のある患者

（全身性強皮症）

2.2 重度の間質性肺炎を有する患者[症状が悪化するおそれがある][1.6 参照]

3. 組成・性状**3.1 組成**

販売名	リツキサン点滴静注 100mg	リツキサン点滴静注 500mg
容量(1バイアル中)	10mL	50mL
有効成分	リツキシマブ(遺伝子組換え) ^{注)}	100mg
添加剤	ポリソルベート80 塩化ナトリウム	7mg 90mg
クエン酸ナトリウム、pH調整剤		

注) 本剤は、チャニニーズハムスター卵巣細胞を用いて製造される。マスターセルバンク構築時にはウシの血清由来成分(ウシ胎児血清及びフェンイン)を使用している。また、製造工程において、培地成分としてウシの乳由来成分(D-ガラクトース)を使用している。

3.2 製剤の性状

販売名	リツキサン点滴静注 100mg	リツキサン点滴静注 500mg
性状	無色～淡黄色の澄明又はわずかに白濁した液	
pH	6.5 ± 0.3	
浸透圧比	約1(生理食塩液に対して)	

4. 効能又は効果

- CD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫
- CD20陽性の慢性リンパ性白血病
- 免疫抑制状態下的CD20陽性のB細胞性リンパ増殖性疾患
- 多発血管炎性肉芽腫症、顕微鏡的多発血管炎
- 既存治療で効果不十分なループス腎炎
- 難治性的ネフローゼ症候群(頻回再発型あるいはステロイド依存性を示す場合)
- 慢性特発性血小板減少性紫斑病
- 後天性血栓性血小板減少性紫斑病
- 全身性強皮症
- 難治性的尋常性天疱瘡及び落葉状天疱瘡
- 視神經脊髓炎スペクトラム障害(視神經脊髓炎を含む)の再発予防
- 下記のABO血液型不適合移植における抗体関連型拒絶反応の抑制
腎移植、肝移植
- インジウム(¹¹¹In)イブリツモマブ チウキセタン(遺伝子組換え)注射液及びイットリウム(⁹⁰Y)イブリツモマブ チウキセタン(遺伝子組換え)注射液投与の前投与

5. 効能又は効果に関する注意

〈B細胞性非ホジキンリンパ腫、慢性リンパ性白血病、免疫抑制状態下的B細胞性リンパ増殖性疾患〉

5.1 本剤投与の適応となる造血器腫瘍の診断は、病理診断に十分な経験を持つ医師又は施設により行うこと。

5.2 免疫組織染色法又はフローサイトメトリー法等によりCD20抗原の検査を行い、陽性であることが確認されている患者のみに投与すること。

〈多発血管炎性肉芽腫症、顕微鏡的多発血管炎〉

5.3 初発例を含む疾患活動性が高い患者、既存治療で十分な効果が得られない患者等に対して本剤の投与を考慮すること。

† 〈既存治療で効果不十分なループス腎炎〉

5.4 既存治療(ステロイド、免疫抑制剤等)で十分な効果が得られない患者に対して本剤の投与を考慮すること。また、診療ガイドライン等の最新の情報を参考に、本剤の投与が適切と判断される患者に使用すること。

〈難治性的ネフローゼ症候群〉

5.5 小児期に特発性ネフローゼ症候群を発症しステロイド感受性を示す患者で、既存治療(ステロイド、免疫抑制剤等)では寛解が維持できない患者に限ること。また、診療ガイドライン等の最新の情報を参考に、本剤の投与が適切と判断される患者に使用すること。なお、成人期に発症したネフローゼ症候群の患者に対する有効性及び安全性は確立していない。

〈慢性特発性血小板減少性紫斑病〉

5.6 他の治療にて十分な効果が得られない場合、又は忍容性に問題があると考えられる場合にのみ使用を考慮し、血小板数、臨床症状からみて出血リスクが高いと考えられる患者に使用すること。また、診療ガイドライン等の最新の情報を参考に、本剤の投与が適切と判断される患者に使用すること。

〈後天性血栓性血小板減少性紫斑病〉

5.7 再発又は難治の場合にのみ使用を考慮すること。また、診療ガイドライン等の最新の情報を参考に、本剤の投与が適切と判断される患者に使用すること。

〈全身性強皮症〉

5.8 「17臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、診療ガイドライン等の最新の情報を参考に、本剤の投与が適切と判断される患者に使用すること。

5.9 皮膚硬化以外の全身性強皮症に伴う病変に対する有効性及び安全性は十分に検討されていないため、これらの患者に投与する場合には、リスクとペネフィットを十分考慮すること。

〈難治性的尋常性天疱瘡及び落葉状天疱瘡〉

5.10 経口ステロイド剤等の既存治療で十分な効果が得られない又は再燃のため経口ステロイド剤の減量が困難な患者に対して本剤の投与を考慮すること。また、「17臨床

成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、本剤の投与が適切と判断される患者に使用すること。

(視神経脊髄炎スペクトラム障害の再発予防)

5.11 本剤は、視神経脊髄炎スペクトラム障害（視神経脊髄炎を含む）^{注1)}の患者に使用すること。

注1)「多発性硬化症・視神経脊髄炎診療ガイドライン2017」（日本神経学会）を参考すること。

5.12 本剤は、抗アクアボリン4抗体陽性の患者に投与すること。

†6. 用法及び用量

(B細胞性非ホジキンリンパ腫)

通常、成人には、リツキシマブ（遺伝子組換え）として1回量375mg/m²を1週間間隔で点滴静注する。最大投与回数は8回とする。他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合は、併用する抗悪性腫瘍剤の投与間に合わせて、1サイクルあたり1回投与する。維持療法に用いる場合は、通常、成人には、リツキシマブ（遺伝子組換え）として1回量375mg/m²を点滴静注する。投与間隔は8週間を目安とし、最大投与回数は12回とする。

(慢性リンパ性白血病)

他の抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人には、リツキシマブ（遺伝子組換え）として初回に1回量375mg/m²、2回目以降は1回量500mg/m²を、併用する抗悪性腫瘍剤の投与サイクルに合わせて、1サイクルあたり1回点滴静注する。最大投与回数は6回とする。

(免疫抑制状態下的B細胞性リンパ増殖性疾患)

通常、リツキシマブ（遺伝子組換え）として1回量375mg/m²を1週間間隔で点滴静注する。最大投与回数は8回とする。

(多発血管炎性肉芽腫症、顕微鏡的多発血管炎、慢性特発性血小板減少性紫斑病、後天性血栓性血小板減少性紫斑病、全身性強皮症)

通常、成人には、リツキシマブ（遺伝子組換え）として1回量375mg/m²を1週間間隔で4回点滴静注する。

(既存治療で効果不十分なループス腎炎)

通常、リツキシマブ（遺伝子組換え）として1回量375mg/m²を1週間間隔で4回点滴静注する。

(難治性のネフローゼ症候群)

通常、リツキシマブ（遺伝子組換え）として1回量375mg/m²を1週間間隔で4回点滴静注する。ただし、1回あたりの最大投与量は500mgまでとする。

(難治性の尋常性天疱瘡及び落葉状天疱瘡)

通常、成人には、リツキシマブ（遺伝子組換え）として1回量1,000mg/bodyを2週間間隔で2回点滴静注する。

(視神経脊髄炎スペクトラム障害の再発予防)

通常、成人には、リツキシマブ（遺伝子組換え）として1回量375mg/m²を1週間間隔で4回点滴静注する。その後、初回投与から6ヶ月毎に1回量1,000mg/body（固定用量）を2週間間隔で2回点滴静注する。

(ABO血液型不適合腎移植・肝移植)

通常、リツキシマブ（遺伝子組換え）として1回量375mg/m²を点滴静注する。ただし、患者の状態により適宜減量する。

(イブリツモマブ チウキセタンの前投与)

通常、成人には、リツキシマブ（遺伝子組換え）として250mg/m²を1回、点滴静注する。

(効能共通)

本剤は用時生理食塩液又は5%ブドウ糖注射液にて1~4mg/mLに希釈調製し使用する。

†7. 用法及び用量に関連する注意

(効能共通)

7.1 本剤投与時に頻発してあらわれるinfusion reactionを軽減するために、本剤投与の30分前に抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤等の前投与を行うこと。また、副腎皮質ホルモン剤と併用しない場合は、本剤の投与に際して、副腎皮質ホルモン剤の前投与を考慮すること。[1.2, 7.8, 11.1.1 参照]

7.2 注入速度に関連して血圧下降、気管支痙攣、血管浮腫等の症状が発現するので本剤の注入速度を守り、注入速度を上げる際は特に注意すること。症状が発現した場合は注入速度を緩めるかましくは中止する。重篤な症状の場合は直ちに投与を中止し、適切な処置を行う。また、投与を再開する場合は症状が完全に消失した後、中止時点の半分以下の注入速度で投与を開始する。[1.2, 11.1.1 参照]

†7.3 注入速度は以下のとおりとする。ただし、患者の状態により注入開始速度は適宜減速すること。

効能又は効果	投与時期	注入速度
・ B細胞性非ホジキンリンパ腫	初回投与	最初の30分は50mg/時で開始し、患者の状態を十分観察しながら、その後30分毎に50mg/時ずつ上げて、最大400mg/時まで上げることができる。
	2回目以降	下記のいずれかに該当する場合は、当該注入速度を選択することができる。 ・ 初回投与時に発現した副作用が軽微であった場合、100mg/時まで上げて投与を開始し、その後30分毎に100mg/時ずつ上げて、最大400mg/時まで上げることができる。 ・ 臨床的に重篤な心疾患がない、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リンパ球数が5,000/ μ L未満である場合、90分間で投与（最初の30分で投与量の20%を投与し、その後60分で投与量の80%を投与）することができる。

効能又は効果	投与時期	注入速度
・ 慢性リンパ性白血病 ・ 免疫抑制状態下的B細胞性リンパ増殖性疾患 ・ 多発血管炎性肉芽腫症、顕微鏡的多発血管炎 ・ 既存治療で効果不十分なループス腎炎 ・ 難治性のネフローゼ症候群（小児以外に用いる場合） ・ 慢性特発性血小板減少性紫斑病 ・ 後天性血栓性血小板減少性紫斑病 ・ 全身性強皮症 ・ 難治性の尋常性天疱瘡及び落葉状天疱瘡 ・ イブリツモマブ チウキセタンの前投与	初回投与	最初の30分は50mg/時で開始し、患者の状態を十分観察しながら、その後30分毎に50mg/時ずつ上げて、最大400mg/時まで上げることができる。
	2回目以降	初回投与時に発現した副作用が軽微であった場合、100mg/時まで上げて投与を開始し、その後30分毎に100mg/時ずつ上げて、最大400mg/時まで上げることができる。
・ 視神経脊髄炎スペクトラム障害の再発予防	初回投与	最初の30分は50mg/時で開始し、患者の状態を十分観察しながら、その後30分毎に50mg/時ずつ上げて、最大400mg/時まで上げることができる。
	2回目以降	初回投与時に発現した副作用が軽微であった場合、100mg/時まで上げて投与を開始し、その後30分毎に100mg/時ずつ上げて、最大400mg/時まで上げることができる。なお、初回投与から6ヶ月毎に1回目の投与は「初回投与」の注入速度に従って投与すること。
・ 難治性のネフローゼ症候群（小児に用いる場合）[17.1.5 参照] ・ ABO血液型不適合腎移植・肝移植	初回投与	最初の1時間は25mg/時とし、患者の状態を十分に観察しながら、次の1時間は100mg/時、その後は最大200mg/時までを目安とすること。
	2回目以降	初回投与時に発現した副作用が軽微であった場合、100mg/時まで上げて投与を開始できる。

〈免疫抑制状態下的B細胞性リンパ増殖性疾患、多発血管炎性肉芽腫症、顕微鏡的多発血管炎、既存治療で効果不十分なループス腎炎、難治性のネフローゼ症候群、慢性特発性血小板減少性紫斑病、後天性血栓性血小板減少性紫斑病、全身性強皮症、難治性の尋常性天疱瘡及び落葉状天疱瘡〉

†7.4 再投与時の有効性及び安全性に関する情報は限られているため、本剤の再投与に関しては、実施の可否を慎重に検討すること。

(B細胞性非ホジキンリンパ腫)

7.5 維持療法に用いる場合は、臨床試験に組み入れられた患者の組織型等について、「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、国内外の最新のガイドライン等を参考に本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。[17.1.2 参照]

7.6 中・高悪性度リンパ腫に対する本剤の維持療法の有効性及び安全性は確立していない。

7.7 他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合は、臨床試験において検討された本剤の投与間隔、投与時期等について、「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、国内外の最新のガイドライン等を参考にすること。[17.1.2 参照]

7.8 本剤投与時に頻発してあらわれるinfusion reactionを軽減するために、本剤を90分間で投与するに際し、併用する化学療法に副腎皮質ホルモン剤が含まれる場合は、当該副腎皮質ホルモン剤の前投与を行うこと。[1.2, 7.1, 11.1.1 参照]

†〈既存治療で効果不十分なループス腎炎〉

7.9 原則として副腎皮質ステロイド剤を併用すること。

(視神経脊髄炎スペクトラム障害の再発予防)

7.10 本剤の血中濃度低下により再発のおそれがあるため、投与間隔を遵守すること。

7.11 本剤による一定期間の治療の後、再発の頻度について検討し、再発の頻度の減少が認められない等、本剤のペネフィットが期待されないと考えられる患者では、本剤による治療の中止を検討すること。

(ABO血液型不適合腎移植・肝移植)

7.12 本剤の投与量及び投与回数は、患者の状態に応じ、適宜調節すること。投与時期については、下記を目安とする。

- ・ ABO血液型不適合腎移植の場合は、原則、移植術2週間前及び1日前に2回点滴静注する。
- ・ ABO血液型不適合肝移植の場合は、原則、移植術2週間以上前に1回点滴静注する。1回投与で抗体価又はB細胞数の減少が不十分な場合には、さらに1回追加投与する。

8. 重要な基本的注意

〈効能共通〉

8.1 Infusion reactionがあらわれることがあるので、バイタルサイン（血圧、脈拍、呼吸数等）のモニタリングや自他覚症状の観察など、患者の状態を十分に観察すること。[1.2, 11.1.1 参照]

8.2 腫瘍崩壊症候群があらわれることがあるので、血清中電解質濃度及び腎機能検査を行なうなど、患者の状態を十分に観察すること。[1.3, 11.1.2 参照]

8.3 本剤の投与により、B型肝炎ウイルスの再活性化による劇症肝炎又は肝炎があらわれることがある。本剤投与に先立ってB型肝炎ウイルス感染の有無を確認し、本剤投与

前に適切な処置を行うこと。[1.4, 9.1.3, 11.1.3 参照]

8.4 肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、肝機能検査を行うなど患者の状態を十分に観察すること。[11.1.4 参照]

8.5 血球減少があらわれることがあるので、本剤の治療期間中及び治療終了後は定期的に血液検査を行うなど患者の状態を十分に観察すること。[9.1.5, 11.1.6 参照]

8.6 本剤の治療中より末梢血リンパ球の減少があらわれ、治療終了後も持続すること、また免疫グロブリンが減少した例が報告されていることなど、免疫抑制作用により細菌やウイルスによる感染症が生じる又は悪化する可能性がある。本剤によりニューモシチス肺炎発現のおそれがあるので、適切な予防措置を考慮すること。[9.1.4, 11.1.7 参照]

8.7 消化管穿孔・閉塞があらわれることがあるので、初期症状としての腹痛、腹部膨満感、下血、吐血、貧血等の観察を十分に行うこと。[11.1.12 参照]

8.8 現在までに、本剤の投与により伝達性海綿状脳症(TSE)がヒトに伝播したとの報告はない。本剤は、マスターセルバンク構築時にカナダ、米国又はニュージーランド産ウシの血清由来成分を使用しているが、理論的リスク評価を行い一定の安全性を確保する目安に達していることを確認している。しかしながら、TSEの潜在的伝播の危険性を完全に排除することはできないことから、疾病的治療上の必要性を十分検討の上、本剤を投与すること。なお、投与に先立ち、患者への有用性と安全性の説明も考慮すること。

（慢性特発性血小板減少性紫斑病）

8.9 本剤により血小板数の過剰増加があらわれたとの報告があるため、血小板数を定期的に測定し、異常が認められた場合は本剤の投与を中止するなど適切な処置を行うこと。[15.1.2 参照]

（免疫抑制状態下的B細胞性リンパ増殖性疾患）

8.10 本剤を使用する際には、関連文献(「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議 公知申請への該当性に係る報告書：リツキシマブ(遺伝子組換)(免疫抑制状態下的CD20陽性のB細胞性リンパ増殖性疾患(成人))」等)を熟読すること。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1 合併症・既往歴等のある患者

（効能共通）

9.1.1 心機能障害のある患者又はその既往歴のある患者

投与中又は投与直後に心電図、心エコー等によるモニタリングを行うなど、患者の状態を十分に観察すること。投与中又は投与後に不整脈、狭心症等を悪化又は再発させるおそれがある。[11.1.10 参照]

9.1.2 肺浸潤・肺機能障害のある患者又はその既往歴のある患者

投与中又は投与直後に気管支痙攣や低酸素血症を伴う急性の呼吸器障害があらわれ、肺機能を悪化させるおそれがある。[1.2, 11.1.1 参照]

9.1.3 肝炎ウイルスの感染又は既往歴を有する患者

本剤の治療期間中及び治療終了後は継続して肝機能検査値や肝炎ウイルスマーカーのモニタリングを行うなど、B型肝炎ウイルスの再活性化の徵候や症状の発現に注意すること。B型肝炎ウイルスキャリアの患者又は既往感染者(HBs抗原陰性、かつHBc抗体又はHBs抗体陽性)で、本剤の投与により、B型肝炎ウイルスの再活性化による劇症肝炎又は肝炎があらわれることがある。なお、HBs抗体陽性患者に本剤を投与した後、HBs抗体が陰性の急性B型肝炎を発症した例が報告されている。[1.4, 8.3, 11.1.3 参照]

9.1.4 感染症(敗血症、肺炎、ウイルス感染等)を合併している患者

免疫抑制作用により病態を悪化させるおそれがある。[8.6, 11.1.7 参照]

9.1.5 重篤な骨髄機能低下のある患者あるいは腫瘍細胞の骨髄浸潤がある患者

好中球減少及び血小板減少を増悪させ重篤化させるおそれがある。[8.5, 11.1.6 参照]

9.1.6 薬物過敏症の既往歴のある患者

9.1.7 アレルギー素因のある患者

（B細胞性非ホジキンリンパ腫、慢性リンパ性白血病、免疫抑制状態下的B細胞性リンパ増殖性疾患、イブリツモマブチウキセタンの前投与）

9.1.8 咽頭扁桃、口蓋扁桃部位に病巣のある患者

病巣腫脹による呼吸困難が発現した場合は、副腎皮質ホルモン剤を投与するなど、適切な処置を行うこと。本剤投与後、炎症反応に起因する病巣の一過性の腫脹がみられ、病巣腫脹により呼吸困難をきたしたという報告がある。

（全身性強皮症）

9.1.9 軽度及び中等度の間質性肺炎を合併する患者

間質性肺炎の増悪があらわれることがあるので、定期的に胸部CT検査や肺機能検査を行うなど患者の状態を十分に観察すること。[1.6 参照]

9.1.10 全身性強皮症に伴う肺高血圧症、腎クリーゼ等の重篤な合併症を有する患者

臨床試験では除外されている。[5.8, 17.1.6 参照]

9.5 妊婦

妊娠又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。ヒトIgGは胎盤関門を通過することが知られており、妊娠中に本剤を投与した患者の出生児において、末梢血リンパ球の減少が報告されている。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。本剤は母乳中に移行することが報告されている。

9.7 小児等

（B細胞性非ホジキンリンパ腫、慢性リンパ性白血病、多発血管炎性肉芽腫症、顕微鏡的多発血管炎、慢性特発性血小板減少性紫斑病、後天性血栓性血小板減少性紫斑病、全身性強皮症、難治性の尋常性天疱瘡及び落葉状天疱瘡、視神経脊髄炎スペクトラム障害の再発予防、イブリツモマブチウキセタンの前投与）

9.7.1 小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

（免疫抑制状態下的B細胞性リンパ増殖性疾患、既存治療で効果不十分なループス腎炎、ABO血液型不適合腎移植・肝移植）

9.7.2 低出生体重児、新生児、乳児を対象とした臨床試験は実施していない。

（難治性のネフローゼ症候群）

9.7.3 低出生体重児、新生児、乳児及び3歳未満の幼児を対象とした臨床試験は実施していない。

9.8 高齢者

患者の状態を十分に観察しながら慎重に投与すること。一般に高齢者では生理機能が低下している。

10. 相互作用

10.2 併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
生ワクチン 又は 弱毒生ワクチン	接種した生ワクチンの原病に基づく症状が発現した場合には適切な処置を行う。	Bリンパ球傷害作用により発病するおそれがある。
不活化ワクチン	ワクチンの効果を減弱させるおそれがある。	Bリンパ球傷害作用によりワクチンに対する免疫が得られないおそれがある。
免疫抑制作用を有する薬剤 免疫抑制剤 副腎皮質ホルモン剤	発熱などの感染症(細菌及びウイルス等)に基づく症状が発現した場合は、適切な処置を行う。	過度の免疫抑制作用による感染症誘発の危険性がある。
降圧剤	一過性の血圧下降があらわれることがある。 [11.1.13 参照]	血圧下降を増強させるおそれがある。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 Infusion reaction(頻度不明)

本剤の投与中又は投与開始後24時間以内に多くあらわれるinfusion reaction(症状：発熱、悪寒、恶心、頭痛、疼痛、そよ痒、発疹、咳、虚脱感、血管浮腫等)が、投与患者の約90%に報告されており、これらの症状は、通常軽微～中等度で、主に本剤の初回投与時にあらわれている。また、アナフィラキシー、肺障害、心障害等の重篤な副作用(低血圧、血管浮腫、低酸素血症、気管支痙攣、肺炎(間質性肺炎、アレルギー性肺炎等を含む)、閉塞性細気管支炎、肺浸潤、急性呼吸促迫症候群、心筋梗塞、心室細動、心原性ショック等)があらわれることがある。抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤、副腎皮質ホルモン剤等の前投与を行った患者においても、重篤なinfusion reactionが発現したとの報告がある。異常が認められた場合は、直ちに投与を中止し、適切な処置(酸素吸入、昇圧剤、気管支拡張剤、副腎皮質ホルモン剤、解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン剤の投与等)を行うとともに、症状が回復するまで患者の状態を十分に観察すること。[1.2, 7.1, 7.2, 7.8, 8.1, 9.1.2 参照]

11.1.2 腫瘍崩壊症候群(頻度不明)

異常が認められた場合は、直ちに投与を中止し、適切な処置(生理食塩液、高尿酸血症治療剤等の投与、透析等)を行うとともに、症状が回復するまで患者の状態を十分に観察すること。[1.3, 8.2 参照]

11.1.3 B型肝炎ウイルスの再活性化による劇症肝炎、肝炎の増悪(頻度不明)

B型肝炎ウイルスの再活性化による劇症肝炎又は肝炎の増悪による肝不全があらわれることがあり、死亡に至った症例が報告されている。異常が認められた場合には、直ちに抗ウイルス剤を投与するなど適切な処置を行うこと。[1.4, 8.3, 9.1.3 参照]

11.1.4 肝機能障害、黄疸(頻度不明)

AST上昇(9.5%)、ALT上昇(9.8%)、Al-P上昇(3.8%)、総ビリルビン上昇(3.8%)等の肝機能検査値異常を伴う肝機能障害や黄疸があらわれることがある。[8.4 参照]

11.1.5 皮膚粘膜症状(頻度不明)

皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis : TEN)、天疱瘡様症状、苔癬状皮膚炎、小水疱性皮膚炎があらわれ、死亡に至った例が報告されている。[1.5 参照]

11.1.6 血球減少

汎血球減少(頻度不明)、白血球減少(45.6%)、好中球減少(43.9%)、無顆粒球症(頻度不明)、血小板減少(13.6%)があらわれることがあり、重篤な血球減少も報告されている。好中球減少については、本剤の最終投与から4週間以上経過して発現する例が報告されている。[8.5, 9.1.5 参照]

11.1.7 感染症(43.4%)

細菌、真菌、あるいはウイルスによる重篤な感染症(敗血症、肺炎等)があらわれることがあるので、本剤の治療期間中及び治療終了後は患者の状態を十分に観察すること。[8.6, 9.1.4 参照]

11.1.8 進行性多臓性白質脳症(PML)(頻度不明)

本剤の治療期間中及び治療終了後は患者の状態を十分に観察し、意識障害、認知障害、麻痺症状(片麻痺、四肢麻痺)、言語障害等の症状があらわれた場合は、MRIによる画像診断及び脳脊髄液検査を行うとともに、投与を中止し、適切な処置を行うこと。

11.1.9 間質性肺炎(頻度不明)

11.1.10 心障害(11.5%)

心室性あるいは心房性の不整脈、狭心症、心筋梗塞が報告されている。

[9.1.1 参照]

11.1.11 腎障害(頻度不明)

血清クレアチニン上昇(1.0%)、BUN上昇(2.6%)等の腎障害があらわることがあり、透析を必要とする腎障害が報告されている。尿量減少、血清クレアチニンやBUNの上昇が認められた場合は投与を中止し、適切な処置を行うこと。

11.1.12 消化管穿孔・閉塞(頻度不明)

異常が認められた場合は、直ちにX線、CT検査等を実施して出血部位、穿孔・閉塞所見の有無を確認し、適切な処置を行うこと。[8.7 参照]

11.1.13 血圧下降(6.4%)

一過性の血圧下降が発現することがある。[10.2 参照]

11.1.14 可逆性後白質脳症症候群等の脳神経症状(頻度不明)

可逆性後白質脳症症候群(症状：痙攣発作、頭痛、精神症状、視覚障害、高血圧等)があらわれることがある。また、本剤の治療終了後6ヶ月までの間に、失明、難聴等の視聴覚障害、感覺障害、顔面神経麻痺等の脳神経障害が報告されている。

11.2 その他の副作用

	5%以上	5%未満	頻度不明
呼吸器	咽喉頭炎(28.9%)、鼻炎(18.6%)、口腔咽頭不快感(11.9%)、咳	呼吸障害、喘鳴、鼻出血	
循環器	血圧上昇(13.6%)、頻脈、潮紅	動悸、血管拡張、徐脈、末梢性虚血	
消化器	恶心・嘔吐(17.7%)、口内炎、腹痛、食欲不振、下痢	口内乾燥、便秘、しづり腹	
過敏症	発熱(35.3%)、そう痒(15.8%)、悪寒(15.5%)、発疹(15.5%)、ほてり(11.2%)	関節痛、尋常性湿疹、筋肉痛、インフルエンザ様症候群	血清病
全身状態	疼痛(29.6%)、倦怠感(18.1%)、虚脱感(17.4%)、頭痛(15.8%)、多汗、浮腫	胸痛、体重増加、無力症	
精神神経系	異常感觉	しびれ感、眩暈、不眠症	
血液・凝固	貧血(20.3%)	好酸球增多 フィブリリン分解産物[FDP、Dダイマー]増加、血小板増加	
腎臓	電解質異常	BUN上昇、クレアチニン上昇	
肝臓	ALT上昇、AST上昇	AL-P上昇、総ビリルビン上昇	
その他	CRP上昇(17.6%)、LDH上昇(10.6%)	総蛋白減少、帯状疱疹、結膜炎、尿酸値上昇、皮脂欠乏性湿疹、投与部位反応(疼痛、腫脹等)、アルブミン減少、しゃべり、筋攣縮	

注)副作用の頻度は、B細胞性非ホジキンリンパ腫に対する国内臨床第II相試験、慢性リンパ性白血病に対する国内臨床第II相試験、難治性のネフローゼ症候群に対する国内臨床第III相試験、全身性強皮症に対する国内臨床第II相試験、難治性の尋常性天疱瘡及び落葉状天疱瘡に対する国内臨床第II相試験、視神経脊髄炎スペクトラム障害の再発予防に対する国内臨床第II/III相試験、ABO血液型不適合腎移植に対する一般臨床試験を基に集計した。

14. 適用上の注意

14.1 薬剤調製時の注意

14.1.1 タンパク質溶液であるために、わずかに半透明の微粒子がみられることがあるが、これにより本剤の薬効は影響を受けない。なお、これ以外の外観上の異常を認めた場合には使用しないこと。

14.1.2 希釀液として生理食塩液又は5%ブドウ糖注射液以外は使用しないこと。

14.1.3 抗体が凝集するおそれがあるので、希釀時及び希釀後に泡立つような激し

い振動を加えないこと。

14.1.4 希釀後の液は速やかに使用すること。また、使用後の残液は、細菌汚染のおそれがあるので使用しないこと。

14.2 薬剤投与時の注意

他剤との混注はしないこと。

15. その他の注意

15.1 臨床使用に基づく情報

〈効能共通〉

15.1.1 本剤が投与された患者ではヒト抗キメラ抗体を生じることがあり、これらの患者に再投与された場合は、アレルギー、過敏反応等が発現するおそれがある。

臨床試験での本剤に対するヒト抗キメラ抗体の検出例数は以下のとおりであった。

(1)日本人のCD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫患者における成績

国内臨床第I相試験及び第II相試験において測定された140例中、本剤に対するヒト抗キメラ抗体は4例に検出された。

(2)外国人のCD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫患者における成績(参考)

海外臨床試験において測定された356例中、本剤に対するヒト抗キメラ抗体は4例に検出された。

(3)日本人のCD20陽性の慢性リンパ性白血病患者における成績

国内臨床第II相試験において測定された7例中、本剤に対するヒト抗キメラ抗体は検出されなかった。

(4)日本人の難治性ネフローゼ症候群患者における成績

国内臨床試験において測定された54例中、本剤に対するヒト抗キメラ抗体は7例に検出された。

(5)全身性強皮症患者における成績

国内臨床試験において測定された48例中、本剤に対するヒト抗キメラ抗体は9例に検出された。

(6)難治性の尋常性天疱瘡及び落葉状天疱瘡患者における成績

国内臨床試験において測定された20例中、本剤に対するヒト抗キメラ抗体は5例に検出された。

(7)日本人の視神経脊髄炎スペクトラム障害患者における成績

国内臨床試験において測定された19例中、本剤に対するヒト抗キメラ抗体は1例に検出された。

(8)ABO血液型不適合腎移植患者における成績

国内臨床試験において測定された20例中、本剤に対するヒト抗キメラ抗体は検出されなかった。

〈慢性特発性血小板減少性紫斑病〉

15.1.2 海外において、血小板数が増加し、血栓塞栓症が認められたとの報告がある。[8.9 参照]

20. 取扱い上の注意

外箱開封後は遮光して保存すること。

21. 承認条件

21.1 医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。

〈ABO血液型不適合腎移植・肝移植〉

21.2 ABO血液型不適合肝移植については、国内での使用経験が極めて限られていることから、製造販売後、一定数の症例に係るデータが集積されるまでの間は、全症例を対象に使用成績調査を実施することにより、本剤使用患者の背景情報を把握するとともに、本剤の安全性及び有効性に関するデータを早期に収集し、本剤の適正使用に必要な措置を講じること。

22. 包装

〈リソキサン点滴静注 100mg〉

10mL[1バイアル]

〈リソキサン点滴静注 500mg〉

50mL[1バイアル]

[発売元]
全薬販売株式会社
東京都豊島区東池袋3-22-14
文献請求先及び問い合わせ先
全薬販売株式会社 医薬情報部 営業学術課
〒112-0012 東京都文京区大塚5-29-4
TEL 03-3946-1119 FAX 03-3946-1103

[製造販売元]
全薬工業株式会社
東京都文京区大塚5-6-15