


ペラゾリン細粒[®]400mgおよびペラゾリン細粒[®]800mgを服用される方へ

2012年4月作成

この薬の名前は	商品名	ペラゾリン細粒 [®] 400mg ペラゾリン細粒 [®] 800mg	剤型写真 	
	一般名	ソブゾキサン(sobuzoxan)		
	剤型	細粒	ペラゾリン細粒 [®] 400mg	ペラゾリン細粒 [®] 800mg
	細粒の色	白色		
	シートの記載 (包装フィルム)	ZY001(ペラゾリン細粒 [®] 400mg) ZY002(ペラゾリン細粒 [®] 800mg)		
この薬の働きは	悪性リンパ腫、成人T細胞性白血病リンパ腫に対する抗悪性腫瘍剤です			
主治医に伝え 忘れたことはありませんか	<p>次のような人は使う前に主治医に相談してください</p> <ul style="list-style-type: none"> ① この薬または他の薬でアレルギーを起こしたことがある人 ② 腎障害、肝障害のある人 ③ 消化管潰瘍のある人 ④ 出血傾向、貧血のある人 ⑤ 感染症を合併している人 ⑥ 水痘を合併している人 ⑦ 妊婦および授乳婦 <p>※ 他に薬を使っている場合(薬局で買った薬も含む)は、その薬を主治医に伝えてください</p>			
この薬の 使い方	<p>① 飲み方</p> <ul style="list-style-type: none"> ・必ず指示に従って水とともに服用してください ・できれば薬を貰ったら、数と服用日を確認し、カレンダーに服用する日の印をつけて飲み忘れのないようにしてください <p>② 誤って多く飲んだ場合 : すぐに主治医に相談してください</p> <p>③ 飲み忘れた場合</p> <p>指示された時間に服用するのを忘れてたら、気が付いた時点で1回分をお飲みください。ただし、次に服用する時間が近い場合は服用せず、その後は指示された時間から飲んでください。2回分をまとめて1度に飲むことは絶対にしないでください。また、飲み忘れたことを主治医にお伝えください。</p>			
生活上の注意	副作用や合併症が起こった時の時間外連絡先を主治医に確かめておいてください			
この薬を使用 した後で 気をつけて いただくこと	<p>副作用は高い頻度で現れます</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 次のような症状に気付いたら、使用をやめてすぐに主治医に相談してください <ul style="list-style-type: none"> ・寒気がする ・戦慄 ・発熱 ・肺炎症状(咳、喀痰、呼吸困難等) ・咽頭痛 ・紫斑 ・出血症状(歯肉、鼻、皮下等) ・腹痛 ・貧血状況(蒼白、貧血、労作性頻脈等) ② 次のような症状に気付いたら、なるべく早めに主治医に相談してください <ul style="list-style-type: none"> ・全身倦怠感 ・気持ちが悪くなる ・食欲がない ・下痢 ・口の中が荒れる ・頭痛 ・めまい ・動悸・息切れ ・易疲労感 ・胃が重い <p>※ ここには、これまでに知られている副作用のうち、特に注意が必要なものを挙げておりますので、他にも何か変だと感じるがありましたら、主治医または薬剤師に相談してください</p>			
その他 (コメント)	最も注意を要する副作用は白血球が減少することです。これは初期に自分では分からないので、必ず血液検査を受けてください			
主治医の連絡先		薬局の連絡先		