



副作用被害救済制度  
電話:0120-149-931

12-1

# 新バツコ液<sup>®</sup>

二日酔いの  
むかつき・  
飲みすぎに



20mL

## 第2類医薬品

### 〔効能・効果〕

はきけ(二日酔・悪酔のむかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心)、飲みすぎ、食べすぎ、胸やけ、もたれ、胸つかえ、胃部・腹部膨満感、消化不良、食欲不振、胃弱、嘔吐。

製造販売元 **全薬工業株式会社**  
東京都文京区大塚5-6-15  
全薬工業お客様相談室 TEL 03(3946)3610

〔用法・用量〕15才以上1回1びん、1日3回食後に服用します。  
○生薬配合製剤ですので、よく振ってから服用してください。

〔成分〕(1びん20mL中) カンゾウ(甘草)エキス 125mg、ソウジュツ抽出液 2.33mL、オウレン抽出液 2.66mL、ケイヒ抽出液 3.66mL、チョウジ抽出液 0.24mL、コショウ抽出液 0.4mL、ゲンチアナ抽出液 1.33mL、アセンヤク 66.66mg  
添加物としてアルコール、安息香酸Na、クエン酸Na、グリセリン、パラベン、プロピレングリコール、*l*-メントール、香料、アマチャエキス、白糖、水アメを含有します。

### 〔使用上の注意〕

してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)長期連用しないこと。

相談すること 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。  
(1)医師の治療を受けている人。(2)高齢者。(3)次の症状のある人。むくみ(4)次の診断を受けた人。高血圧、腎臓病、心臓病 2.服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師の診療を受けること。●偽アルドステロン症、ミオパチー:手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。3.5~6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

### 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光のあたらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。
- (4)キャップの切り口で手指等を切らないように注意してください。

使用  
期限  
(年.月)  
製造  
番号

