

開封年月日  
年 月 日  
開封時に記入してください



使用期限  
(年月)  
製造番号

酸性・虚弱体質に  
**カタセ錠**

450錠  
第3類医薬品

第3類医薬品

酸性・虚弱体質に  
**カタセ錠**  
〔有核錠〕


450錠

成分 (6錠中)

カルシウム 720mg

外皮:  
沈降炭酸カルシウム……………1,800mg  
(カルシウムとして720mg)  
ヨクイニン末……………250mg  
内核:  
モルシン……………100mg  
ヨクイニン末……………50mg  
銅クロロフィルリンナトリウム……………10mg  
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)……………10mg

添加物としてD-ソルビトール、タルク、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、グリチルリチン酸2K、ケイ酸A0、硬化油、ステアリン酸Mg、セルロース、ヒドロキシプロピルスターチ、無水ケイ酸、無水ケイ酸水加物を含みます。



カタセ錠の断面

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 品質保持のため、錠剤をとりだすときはキャップにとり、手にふれた錠剤はビンに戻さないでください。
- (5) ビンの中の詰め物(透明フィルム、クッション)は、錠剤の破損防止のために入れてあります。開封後、透明フィルムはすべててください。(開封後に詰め物を出し入れすると、湿気やホコリなどが入り込み、品質が低下する原因になる。)
- (6) 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。



製造販売元 全薬工業株式会社



製造販売元 全薬工業株式会社

効能・効果

酸性体質<sup>※</sup>、虚弱体質、栄養補給、妊産婦および授乳婦の栄養補給。  
※酸性体質とは、体が虚弱で、病気にかかりやすい体質をいいます。

用法・用量

次の量を服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
15才以上	3錠	2回
7才以上 15才未満	2錠	
5才以上 7才未満	1錠	
5才未満	服用しないこと	

(用法・用量に関連する注意)

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 本剤は水又はぬるま湯で服用してください。

使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。医師の治療を受けている人。
2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。便秘
3. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

製造販売元

**全薬工業株式会社**  
東京都文京区大塚5-6-15  
<https://www.zenyaku.co.jp>  
全薬工業お客様相談室 TEL 03(3946)3610  
(月～金曜日9:00～17:00(祝日を除く))

第3類医薬品 販売名:カタセ錠



4 987305 321534

副作用被害救済制度  
電話:0120-149-931

