

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。

また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

つらい風邪に効く
胃を守る成分プラス**ジキニン® First** 頸粒

—かぜ薬—

[第2類医薬品] 販売名:ジキニンファースト顆粒 N

- つらい風邪の諸症状(のどの痛み、発熱、せき、たん、鼻水、鼻づまりなど)を緩和します。
- 胃粘膜保護成分グリシンを配合しています。
- サッと溶けるクイックリリース製法を採用しました。



使用上の注意



してはいけないこと



してはいけません！

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。)

1. 次の人は服用しないでください。

- 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 12才未満の小児。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

(眠気等があらわれることがある。)

4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。

5. 服用前後は飲酒しないでください。

6. 長期連用しないでください。



相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- 妊娠又は妊娠していると思われる人。
- 高齢者。
- 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 次の症状のある人。高熱、むくみ、排尿困難
- 次の診断を受けた人。甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|-------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい |
| 泌尿器 | 排尿困難 |
| その他 | 過度の体温低下 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|---|--|
| ショック (アナフィラキシー) | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 |
| 皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症 | 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。 |
| * 薬剤性過敏症症候群 | 皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節(首、わきの下、股の付け根等)のはれ等があらわれる。 |

【表面からのつづき】

| | |
|-----------------|---|
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |
| 腎障害 | 発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。 |
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切がる・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |
| ぜんそく | 息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。 |
| 再生不良性貧血 | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつとする、血尿等があらわれる。 |
| 無顆粒球症 | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。 |
| 呼吸抑制 | 息切れ、息苦しさ等があらわれる。 |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

便秘、口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

かぜの諸症状(のどの痛み、発熱、せき、たん、鼻水、鼻づまり、頭痛、悪寒(発熱によるさむけ)、くしゃみ、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

【用法・用量】

次の量を食後なるべく30分以内に服用してください。

| 年 齢 | 1 回量 | 1 日服用回数 |
|-------------|---------|---------|
| 15才以上 | 1包 | 3回 |
| 12才以上 15才未満 | 2/3包 | |
| 12才未満 | 服用しないこと | |

<用法・用量に関する注意>

(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(2) 本剤は水又はぬるま湯で服用してください。

【成 分】(1包1.2g中)

| 成 分 | 分量(原生葉換算量) | は た ら き |
|-------------------|--------------|---------------------|
| アセトアミノフェン | 300mg | のどの痛み、発熱、さむけを緩和します。 |
| ジヒドロコデインリン酸塩 | 8mg | せきを鎮めます。 |
| ノスカピン | 16mg | |
| dl-メチルエフェドリン塩酸塩 | 20mg | 気管支を拡張し、せきを鎮めます。 |
| カンゾウ(甘草)エキス粉末 | 96mg (751mg) | 炎症を抑え、せき、たんを緩和します。 |
| d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 1.17mg | 鼻水、鼻づまり、くしゃみを抑えます。 |
| 無水カフェイン | 25mg | 頭痛を緩和します。 |
| グリシン | 60mg | 胃への負担を緩和します。 |

添加物としてアスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、タルク、部分アルファー化デンプン、エリスリトル、ステビア抽出物、デキストリン、ボビドン、無水ケイ酸、メタケイ酸アルミン酸Mgを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

問い合わせ先

- 1) お買い求めのお店
- 2) 全薬工業お客様相談室
住所：〒112-8650 東京都文京区大塚5-6-15
電話：03（3946）3610
受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日を除く）