

90錠

第2類医薬品

新大宝心

動悸・息切れ・気付けに



開封年月日
年
月 日

販売名 新大宝心

押してあける

第2類医薬品

90錠
〔糖衣錠〕

服用に際して、この箱の表示を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるようこの箱を大切に保管してください。

【使用上の注意】

■してはいけないこと■

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)

本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。他の強心薬

■相談すること■

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
消化器	吐き気・嘔吐

3. 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■保管及び取扱い上の注意■

- (1) 直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

発売元
全薬工業株式会社
東京都文京区大塚5-6-15
http://www.zenyaku.co.jp
全薬工業お客様相談室 TEL 03(3946)3610
<月～金曜日9:00～17:00(祝日を除く)>

製造販売元
大峰堂薬品工業株式会社
奈良県大和高田市根成柿574

副作用被害救済制度
電話:0120-149-931

新

大宝心

配合強心薬

ゴウオウウツ
牛黄・熊胆
センジュ
蟾酥

ジャコウ
麝香
ユウタン
熊胆

90錠 第2類医薬品

【効能・効果】

動悸、息切れ、気つけ。

【用法・用量】

次の量を、食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
15才以上	1錠	2回
15才未満	服用しないこと	

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) かまわずに服用してください。



L-L

製造販売
元(自主)
使用期限

