

*：2019年3月改訂(第29版)

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

ドックマン®

3錠タイプの総合保健薬

第2類医薬品

ドックマンは、生体に不可欠なビタミン、ミネラルに加え、消化促進成分、滋養強壮成分など21種類の有効成分がバランスよく配合された、働き盛りから高齢層にかけて幅広くご服用いただける、3錠タイプの総合保健薬です。

“だるい、疲れる、食欲がない”といった症状のある方の栄養補給に適します。

【使用上の注意】



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊娠3ヵ月以内の妊婦、妊娠していると思われる人又は妊娠を希望する人。
(妊娠3ヵ月前から妊娠3ヵ月までの間にビタミンAを1日10,000国際単位以上摂取した妊婦から生まれた児に先天異常の割合が上昇したとの報告がある。)
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気・嘔吐 |

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢
- しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【用法・用量】

次の量を水またはぬるま湯で服用してください。

| 年 齢 | 1 回 量 | 1日服用回数 |
|-----------|-------------------------|--------|
| 大人（15才以上） | 1コマ（褐色錠、橙色錠と白色錠をそれぞれ1錠） | 1～2回 |
| 15才未満 | 服用しないこと | |

〈用法・用量に関連する注意〉

- 食前・食後、いずれの服用でも構いません。
- 服用の前後30分はお茶・コーヒー等を飲まないでください。
(鉄分の吸収が悪くなることもある。)
- 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながる。)



【効能・効果】

肉体疲労・食欲不振・栄養障害・病中病後・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給、滋養強壯、虚弱体質。

*【成分】 (各色1錠中)

褐色錠

| | | | |
|-----------|-------|-----------------------|-----------|
| イカリ草エキス | 50 mg | シアノコバラミン (ビタミンB12) | 2.5 µg |
| プロザイム6 | 25 mg | アスコルビン酸 (ビタミンC) | 50 mg |
| 肝臓加水分解物 | 15 mg | 葉酸 | 0.5 mg |
| 胆汁末 | 25 mg | ニコチン酸アミド | 10 mg |
| 大豆レシチン | 10 mg | パントテン酸カルシウム | 5 mg |
| ルチン水和物 | 25 mg | トコフェロール酢酸エステル (ビタミンE) | 2.5 mg |
| イノシトール | 25 mg | エルゴカルシフェロール (ビタミンD2) | 200国際単位 |
| グルクロノラクトン | 10 mg | ビタミンA | 2,000国際単位 |
| タウリン | 25 mg | | |

橙色錠

| | |
|--------------------|--------|
| チアミン硝酸物 (ビタミンB1) | 10 mg |
| リボフラビン (ビタミンB2) | 2.5 mg |
| ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB6) | 1.5 mg |

白色錠

| | |
|------------|---------|
| 溶性ピロリン酸第二鉄 | 15.7 mg |
|------------|---------|

添加物としてゼラチン、タルク、炭酸Ca、乳糖、ビタミンE、ヒドロキシプロピルセルロース、ラウリン酸ソルビタン、ラッカセイ油、青色1号、赤色102号、黄色5号、カルナウバロウ、グリセリン脂肪酸エステル、硬化油、酵母、酸化チタン、ステアリン酸Mg、セラック、セルロース、デキストリン、トウモロコシ油、白糖、ヒマシ油、ポビドン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、無水ケイ酸、リン酸水素Caを含有します。

〈成分に関連する注意〉

本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、これは本剤中のリボフラビン(ビタミンB2)によるものですので、ご心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

問い合わせ先

1) お買い求めのお店

2) 全薬工業お客様相談室

住 所：〒112-8650 東京都文京区大塚5-6-15

電 話：03 (3946) 3610

受付時間：9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)



製造販売元 **全薬工業株式会社**
東京都文京区大塚5-6-15
<https://www.zenyaku.co.jp>