

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

アイラート[®]40

目薬

第3類医薬品

販売名：アイラート40

アイラート40は、低下した目の機能の回復を早め、「かすみ目」、「疲れ目」に効果を発揮する目薬です。

1. 目の調節機能の回復を早めるビタミンB₁₂とネオスチグミンメチル硫酸塩を配合しています。
2. 目の疲れに伴う炎症を鎮めます。

【使用上の注意】



相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3)次の症状のある人。
はげしい目の痛み
- (4)次の診断を受けた人。
緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1)目のかすみが改善されない場合。
- (2)2週間位使用しても症状がよくなる場合。

【効能・効果】

目のかすみ(目やにの多いときなど)、目の疲れ、結膜充血、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ。

【用法・用量】

1回1～3滴、1日3～6回点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。〔汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因になる〕
また、混濁したものは使用しないでください。
- (3)ソフトコンタクトレンズ及び酸素透過性ハードコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4)点眼用にのみ使用してください。

◎ワンポイントアドバイス◎

- 点眼後は目からあふれた液を清潔なガーゼやティッシュ等で拭き、目頭を押さえて1～2分間静かに目を閉じておくのが効果的です。
- 点眼後にコンタクトレンズを装着するときは、5～10分以降に装着しましょう。



【成 分】 (10mL中)

成 分	分量	はたらき
シアノコバラミン (ビタミンB12)	2mg	毛様体筋に働き、ピント調節機能の回復を早め、かすみ目を改善します。
酢酸 <i>l</i> - α -トコフェロール (天然型ビタミンE)	1.5mg	脂質の過酸化を防ぎ、末梢血行を改善して、疲れ目を改善します。
イブシロン-アミノカプロン酸	100mg	目の疲れに伴う炎症を鎮めます。
グリチルリチン酸二カリウム	10mg	
ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.5mg	毛様体筋に働き、ピント調節機能の回復を早め、かすみ目を改善します。
L-アスパラギン酸カリウム	50mg	目の細胞の代謝促進作用を有し、疲れ目を改善します。

添加物としてエデト酸Na、塩化ベンザルコニウム、クロロブタノール、パラベン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート80、*l*-メントール、塩化Na、*l*-カンフル、ポビドン含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光のあたらない涼しい所に密栓して保管してください。特に自動車等、高温になる所に放置しないでください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)本品が衣類に付着したときは、直ちに石けん水で洗い落としてください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。

問い合わせ先

- 1) お買い求めのお店
- 2) 全薬工業お客様相談室
住 所：〒112-8650 東京都文京区大塚5-6-15
電 話：03 (3946) 3610
受付時間：9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)



製造販売元 **全薬工業株式会社**
東京都文京区大塚5-6-15
<https://www.zenyaku.co.jp>