

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。



貧血用薬

鉄・ビタミンB₁₂・葉酸配合 腸溶性糖衣錠

第2類医薬品

ヘマニックは、赤血球をつくるのに必要な鉄・ビタミンB₁₂・葉酸をバランス良く配合した、貧血治療薬です。一般に鉄剤は、胃に負担がかかると言われていますが、本品は胃では溶けずに腸で初めて溶けるように被膜を施した腸溶性糖衣錠です。

【使用上の注意】



してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)

本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の貧血用薬

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、 胃部不快感、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
便秘、下痢
4. 2週間間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

貧血。

【用法・用量】

次の量を食後に服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
大人（15才以上）	2 錠	1 回
8才以上 15才未満	1 錠	
8才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)服用の前後30分はお茶・コーヒー等を飲まないでください。
- (3)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (4)本剤は水又はぬるま湯で、かまずに服用してください。

【成 分】（2錠中）

成 分	分量	はたらき
溶性ピロリン酸第二鉄	79.5 mg	鉄として10mg。赤血球の素となる鉄分を補給し、貧血を改善します。
シアノコバラミン(ビタミンB ₁₂)	50 μg	赤血球の形成を助け、貧血を改善します。
葉酸	2 mg	

添加物としてゼラチン、タルク、炭酸Ca、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、赤色102号、黄色5号、アラビアゴム、カルナウバロウ、グリセリン脂肪酸エステル、酸化チタン、ステアリン酸M、セルロース、白糖、ヒプロメロースフタル酸エステル、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、リン酸水素Caを含有します。

〈成分に関連する注意〉

配合されている溶性ピロリン酸第二鉄により、便が黒くなることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)品質保持のため、錠剤をとりだすときはキャップにとり、手にふれた錠剤はビンに戻さないでください。
- (5)ビンの中の詰め物は、錠剤の破損防止のために入れてあります。開封後は詰め物をすててください。(開封後に詰め物を出し入れすると、湿気やホコリなどが入り込み、品質が低下する原因になる。)
- (6)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

問い合わせ先

- 1) お買い求めのお店
- 2) 全薬工業お客様相談室
住 所：〒112-8650 東京都文京区大塚5-6-15
電 話：03 (3946) 3610
受付時間：9:00～17:00（土・日・祝祭日を除く）



製造販売元 **全薬工業株式会社**
東京都文京区大塚5-6-15