服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

全薬養生漢方®

桂枝加朮附湯エキス〔細粒〕15 <漢方製剤>

第２類医薬品

桂枝加朮附湯エキス〔細粒〕15は、
１．冷えると手足の関節や神経の痛みが悪化する方の関節痛、神経痛を改善する漢方薬です。
２．サラッとして服用しやすい淡褐色の細粒剤です。

【使用上の注意】

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。）

次の人は服用しないでください。

生後３ヵ月未満の乳児。

相談すること

１．次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
(4)高齢者。
(5)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
(6)次の症状のある人。むくみ
(7)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病

２．服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症　状
皮　膚	発疹・発赤、かゆみ
その他	動悸、のぼせ、ほてり、口唇・舌のしびれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症　状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

３．１ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

４．長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

体力虚弱で、汗が出、手足が冷えてこわばり、ときに尿量が少ないものの次の諸症：関節痛、神経痛

【用法・用量】

次の量を食前又は食間※に服用してください。

年　齢	1回量	1日服用回数
大人（15才以上）	1包	3回
7才以上 15才未満	2/3包	
4才以上　7才未満	1/2包	
2才以上　4才未満	1/3包	
2才未満	1/4包	

〔※食間：「食事と食事の間」という意味で、食後2～3時間を指します。〕

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(2)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。
(3)本剤は水又はぬるま湯で服用してください。

【成　　分】（3包6.0g中）

桂枝加朮附湯エキス・・・・・・・3.7g

〔
ケイヒ・・・・・・・・・・・2.0g
シャクヤク・・・・・・・・・2.0g
タイソウ・・・・・・・・・・2.0g
ショウキョウ・・・・・・・・0.5g
カンゾウ・・・・・・・・・・1.0g
ソウジュツ・・・・・・・・・2.0g
ブシ末・・・・・・・・・・・0.5g　より抽出。
〕

添加物として乳糖、バレイショデンプン、ヒプロメロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、香料を含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2)小児の手のとどかない所に保管してください。
(3)他の容器に入れかえないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わる。）
(4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
(5)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。
○本剤は天然物を原料としていますので、製品により若干色調が異なることがありますが、効果には変わりありません。

問い合わせ先

1)お買い求めのお店
2)全薬工業お客様相談室
住　　所：〒112-8650　東京都文京区大塚5-6-15
電　　話：03（3946）3610
受付時間：9:00～17:00（土・日・祝祭日を除く）

発売元
全薬工業株式会社
東京都文京区大塚5-6-15

製造販売元
松浦薬業株式会社
名古屋市昭和区円上町24-21