

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

# 新リコリス「ゼンヤク」

滋養強壮保健薬

第2類医薬品\*

新リコリス「ゼンヤク」は、甘い生薬・カンゾウ(甘草)エキスを配合した、発熱性消耗性疾患時などの場合の栄養面を配慮してつくられた、のみやすい内服液剤です。カフェインは配合しておりませんので、お休み前でも服用頂けます。

## 【使用上の注意】



してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)

長期連用しないでください。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1)医師の治療を受けている人。

(2)高齢者。

(3)次の症状のある人。

むくみ

(4)次の診断を受けた人。

心臓病、高血圧、腎臓病

2. 服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 【効能・効果】

発熱性消耗性疾患・病中病後・肉体疲労・胃腸障害・妊娠授乳期・栄養障害などの場合の栄養補給、虚弱体質、滋養強壮。

## 【用法・用量】

次の量を服用してください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
15才以上	1びん (20mL)	3回
15才未満	服用しないこと	

### 〈用法・用量に関連する注意〉

食前・食後、いずれの服用でも構いません。

## 【成 分】 (1びん20mL中)

カンゾウ(甘草)エキス…………… 300 mg  
(原生薬換算量 1,500 mg)

ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB<sub>6</sub>)…………… 5 mg

オロチン酸コリン…………… 35 mg

パンテノール…………… 20 mg

タウリン…………… 200 mg

添加物としてアルコール、クエン酸Na、パラベン、プロピレングリコール、カラメル、チンピチンキ、白糖を含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光のあたらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

## 問い合わせ先

- 1) 購入した薬局・薬店
- 2) 全薬工業お客様相談室  
住 所：〒112-8650 東京都文京区大塚5-6-15  
電 話：03 (3946) 3610  
受付時間：9:00～17:00 (土・日・祝祭日を除く)



製造販売元 **全薬工業株式会社**

東京都文京区大塚5-6-15

<http://www.zenyaku.co.jp>