

本品には添付文書はありませんので、
個箱の画像を掲載します。

第2類医薬品

リコリス

ゼンヤク

ゴールドα

使用期限(年、月) 製造番号

効能・効果

●滋養強壮
●発熱性消耗性疾患・肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・妊娠授乳期などの場合の栄養補給
●虚弱体質

用法・用量

成人(15才以上)1回1びん(50mL)を1日1回服用してください。
※小児(15才未満)は服用しないこと。

成分

(1びん50mL中)

成分	分量 (原生薬換算量)
カンゾウ(甘草)エキス	1,000mg (5,000mg)
バクモンドウエキス	500mg (1,000mg)
ゴミシエキス	107mg (600mg)
サイコエキス	100mg (500mg)
タイソウエキス	400mg (1,000mg)
ニンジンエキス	54.6mg (600mg)
トウキエキス	100mg (500mg)
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆)	15mg

添加物としてアルコール、クエン酸、クエン酸Na、D-ソルビトール、炭酸水素Na、パラベン、プロピレングリコール、香料、L-アスパラギン酸Na、エリソルビン酸Na、塩化K、チンピチンキ、白糖、水アメを含有します。

副作用被害救済制度
電話:0120-149-931

カゼや熱による
疲れ
栄養補給に

を吹き飛ばしたい時の

リコリス

ゼンヤク

ゴールドα

生薬量 **9,200mg***
7種の生薬 配合
*原生薬換算量
50mL 第2類医薬品
全薬工業株式会社

紙箱

2-F

販売名:リコリス「ゼンヤク」ゴールドα

リコリス

ゼンヤク

ゴールドα

第2類医薬品

使用上の注意

してはいけないこと
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)長期連用しないこと。
相談すること
1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
(1)医師の治療を受けている人。
(2)高齢者。
(3)次の症状のある人。むくみ
(4)次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、腎臓病
2.服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師の診療を受けること。●海アルドステロン症、ミオパチー、手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
3.5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

保管及び取扱い上の注意
(1)直射日光のあたらない涼しい所に保管すること。
(2)小児の手のとどかない所に保管すること。
(3)使用期限を過ぎた製品は、服用しないこと。
(4)キャップの切り口で手指等を切らないように注意すること。
○生薬エキス配合製剤のため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には変わりありません。

第2類医薬品

リコリス

ゼンヤク

ゴールドα

第2類医薬品

押してあげる

滋養強壮剤

次のようなときの栄養補給に
●カゼや熱でつらいとき
●疲れやだるさがあるとき
●食欲がないとき

7種の生薬とビタミンB₆が
複合的にアプローチ

カンゾウ

バクモンドウ

ゴミシ

サイコ

タイソウ

ニンジン

トウキ

ビタミンB₆

おやすみ前にもおすすめな
ノンカフェイン

製造販売元 全薬工業株式会社
東京都文京区大塚5-6-15
全薬お客様相談室 TEL03(4476)8030
(月～金曜日 9:00～17:00 (祝日を除く))