

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

# ピロットA錠

持続性アレルギー用薬

第2類医薬品

販売名：ピロットA錠

ピロットA錠は、かゆみを抑える抗ヒスタミン剤(メキタジン)に、3種のビタミン(ビタミンB<sub>2</sub>、ビタミンB<sub>6</sub>、ニコチン酸アミド)を配合したアレルギー用薬で、鼻炎、しっしんによるかゆみなどに効果を発揮します。

## 【使用上の注意】



### してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。)

1. 次の人は服用しないでください。  
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。  
他のアレルギー用薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬、乗物酔い薬等)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。  
(眠気等があらわれることがある。)
4. 服用前後は飲酒しないでください。
5. 長期連用しないでください。

### 相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1)医師の治療を受けている人。  
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3)授乳中の人。  
(4)高齢者。  
(5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(6)次の症状のある人。排尿困難  
(7)次の診断を受けた人。緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、腹痛
精神神経系	頭痛、ふらふら感
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

(裏面につづく)

〔表面からのつづき〕

肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
血小板減少	血液中の成分である血小板の数が減ることにより、鼻血、歯ぐきからの出血、青あざ等の出血症状があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。口のかわき、眠気
- 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

**【効能・効果】** 鼻炎、湿疹・かぶれによるかゆみ、じんましん

### 【用法・用量】

次の1回量を1日2回（朝・夕）服用してください。 **〈用法・用量に関連する注意〉**

本剤は水又はぬるま湯で服用してください。

年 齢	1 回 量
15才以上	2 錠
15才未満	服用しないこと

### 【成 分】（4錠中）

成 分	分量	はたらき
メキタジン	4mg	鼻炎やじんましんなどのアレルギー症状を改善します。
リボフラビン（ビタミンB <sub>2</sub> ）	12mg	皮ふ・粘膜の正常な働きを助けるビタミンです。
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB <sub>6</sub> ）	30mg	湿疹・皮ふ炎の改善作用などを有するビタミンです。
ニコチン酸アミド	60mg	

添加物として乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスカルメロースNa、硬化油、酸化チタン、ステアリン酸Mg、セルロース、ヒプロメロース、マクロゴールを含有します。

### 〈成分に関連する注意〉

本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、これは本剤中のリボフラビン（ビタミンB<sub>2</sub>）によるものですので、ご心配ありません。

### 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- 品質保持のため、錠剤をとりだすときはキャップにとり、手にふれた錠剤はビンに戻さないでください。
- ビンの中の詰め物（透明フィルム、クッション）は、錠剤の破損防止のために入れてあります。開封後、透明フィルムはすててください。（開封後に詰め物を出し入れすると、湿気やホコリなどが入り込み、品質が低下する原因になる。）
- 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

### 問い合わせ先

- お買い求めのお店
- 全薬工業お客様相談室  
住 所：〒112-8650 東京都文京区大塚5-6-15  
電 話：03（3946）3610  
受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日を除く）



製造販売元 **全薬工業株式会社**  
東京都文京区大塚5-6-15  
<https://www.zenyaku.co.jp>