

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

外用湿疹・皮ふ炎用薬

しっしん
かぶれ

ラリーエイ®【クリーム】

デキサメタゾン製剤

第2類医薬品

ラリーエイは、炎症を抑えて皮ふの赤み、ブツブツ、かゆみといったしっしんや皮ふ炎の症状を改善する、使用感の良いクリーム剤です。

使用上の注意



してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)

1. 次の部位には使用しないでください。
水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください。
3. 長期連用しないでください。

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4)患部が広範囲の人。
(5)湿潤やただれのひどい人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------------|------------------------------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 皮膚 (患部) | みずむし・たむし等の白せん、にきび、 化膿症状、持続的な刺激感 |

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

湿疹、かぶれ、皮ふ炎、あせも、かゆみ、虫さされ、じんましん、しもやけ。

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)外用にのみ使用してください。

成分

| 成分 | 分量(1g中) | はたらき |
|---------|---------|--|
| デキサメタゾン | 0.5 mg | ステロイド性抗炎症剤。 湿疹・皮ふ炎などの炎症を抑え、かゆみやかぶれを改善します。 |

添加物としてクエン酸、ステアリルアルコール、ステアリン酸ソルビタン、セタノール、パラベン、ポリソルベート60、ステアリン酸グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、1,3-ブチレングリコール、ベヘニルアルコール、ラウロマクロゴールを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光のあたらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。

問い合わせ先

- 1) 購入した薬局・薬店
- 2) 全薬工業お客様相談室
住 所：〒112-8650 東京都文京区大塚5-6-15
電 話：03 (3946) 3610
受付時間：9:00～17:00 (土・日・祝祭日を除く)



製造販売元 **全薬工業株式会社**

東京都文京区大塚5-6-15

<http://www.zenyaku.co.jp>