

*：2019年3月（使用上の注意改訂：第7版）

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

痔による痛み・出血・はれ

サブス坐剤

外用痔疾用薬

リドカイン・ジブカイン塩酸塩配合

販売名：サブス坐剤

第2類医薬品

サブス坐剤は、痔による痛み、出血、はれ、かゆみといった不快な症状を改善する外用痔疾用薬です。2種類の異なる局所麻酔剤、リドカイン・ジブカイン塩酸塩がすばやく、持続的に患部の痛みを鎮めます。また、ステロイド性抗炎症剤プレドニゾロン酢酸エステルが炎症を抑え、はれを鎮めます。

【使用上の注意】



してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。)

1. 次の人は使用しないでください。

※(1)本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジンによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(2)患部が化膿している人。

2. 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

3. 使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。(眠気等があらわれることがある。)

4. 長期連用しないでください。

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1)医師の治療を受けている人。

(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(4)次の症状のある人。排尿困難

(5)次の診断を受けた人。緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
泌尿器	排尿困難
その他	刺激感、化膿

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

〔裏面につづく〕

〔表面からのつづき〕

再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 使用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。口のかわき、眠気
4. 10日間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【成 分】 (1個1.5g中)

成 分	分量	はたらき
リドカイン	20 mg	患部の痛みを鎮めます。
ジブカイン塩酸塩	6.67 mg	
ブレドニゾン 酢酸エステル	1 mg	患部の炎症をおさえ、はれを鎮めます。
塩酸テトラヒドロゾリン	1 mg	患部の出血をおさえます。
クロルヘキシジン塩酸塩	4 mg	殺菌消毒作用があります。
クロルフェニラミン マレイン酸塩	4 mg	患部のかゆみをおさえます。
アラントイン	20 mg	傷の治りを早めます。
トコフェロール酢酸 エステル(ビタミンE)	60 mg	患部の血液循環を改善します。

添加物としてハードファット、無水ケイ酸を含有します。

【用法・用量】

次の量を肛門内に挿入してください。

年 齢	1回量	1日使用回数
15才以上	1個	1～3回
15才未満	使用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉


- (1)小児(15才未満)には使用させないでください。
- (2)本剤が軟らかい場合には、しばらく冷やした後に使用してください。また、硬すぎる場合には、軟らかくなった後に使用してください。
- (3)肛門にのみ使用してください。


【効能・効果】

いぼ痔・きれ痔(さけ痔)の痛み・出血・はれ・かゆみの緩和。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光のあたらない湿気の少ない30℃以下の涼しい所に保管してください。



※本剤は体温で溶けるように製剤設計しております。温度が上がると坐剤が溶け、変形することがありますので、図のように坐剤の先(とがった方)が下向きになるように箱に入れ、マークのとおり立てて保管してください。

- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。

問い合わせ先

- 1) お買い求めのお店
- 2) 全薬工業お客様相談室
住 所：〒112-8650 東京都文京区大塚5-6-15
電 話：03 (3946) 3610
受付時間：9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)



製造販売元 **全薬工業株式会社**
東京都文京区大塚5-6-15
<https://www.zenyaku.co.jp>