

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

# ステイブ<sup>®</sup>胃腸薬

第3類医薬品

ステイブ胃腸薬は、

1. 弱った胃に活力を与えるガジュツ末など各種健胃生薬
2. 脂肪の消化を助けるウルソデオキシコール酸
3. 傷んだ胃粘膜を保護するカンゾウ(甘草)末を配合した胃の弱い方などのための胃腸薬です。

## 【使用上の注意】



相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1)医師の治療を受けている人。  
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3)次の診断を受けた人。  
腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
便秘、下痢
3. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 【効能・効果】

- もたれ(胃もたれ)、胃部不快感、胃部・腹部膨満感、胃弱
- 食べすぎ(過食)、飲みすぎ(過飲)、消化不良、消化促進、食欲不振(食欲減退)、胃重
- はきけ(むかつき)、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐
- 胸やけ、胸つかえ、胃酸過多、げっぷ(おくび)、胃痛

## 【用法・用量】

次の量を食後に服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
15才以上	1 包	3 回
11才以上 15才未満	2/3 包	
8才以上 11才未満	1/2 包	
5才以上 8才未満	1/3 包	
3才以上 5才未満	1/4 包	
3才未満	服用しないこと	

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)本剤は水又はぬるま湯で服用してください。

## 【成 分】 (1 包 1.5 g 中)

成 分	分 量	はたらき
ガジュツ末	100mg	健胃作用のある植物生薬です。
ウルソデオキシコール酸	10mg	胆汁分泌促進作用があり、消化を促進します。
カンゾウ(甘草)末	120mg	植物生薬で他の有効成分のはたらきをサポートします。
オウレン末	80mg	健胃作用のある植物生薬です。
ケイヒ末	75mg	
ゲンチアナ末	40mg	
チョウジ末	40mg	
コショウ末	8mg	
炭酸水素ナトリウム	530mg	制酸作用があり、胸やけ・胃酸過多を改善します。

添加物としてヒドロキシプロピルセルロース、*l*-メントール、アセンヤク、アマチャ、ケイ酸Al、ステアリン酸Mg、セルロース、白糖、ヒドロキシプロピルスターチ、*d*-ボルネオール、無水ケイ酸を含有します。



ガジュツ

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (4)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

## 問い合わせ先

- 1) お買い求めのお店
- 2) 全薬工業お客様相談室  
住 所：〒112-8650 東京都文京区大塚5-6-15  
電 話：03 (3946) 3610  
受付時間：9:00～17:00 (土・日・祝祭日を除く)



製造販売元 **全薬工業株式会社**

東京都文京区大塚5-6-15

<http://www.zenyaku.co.jp>